



原子核物理学2

物理第二教室 原子核理論研究室 萩野浩一

1. 原子核の基本概念(質量、大きさ、形など)
2. 原子核の表面振動
3. 核分裂
4. 魔法数と殻模型
5. 原子核の対相関
6. 原子核の変形
7. 原子核の安定性(α 崩壊、 β 崩壊、 γ 崩壊)
8. 超重元素の物理



核子多体問題



原子核 = 陽子と中性子の多体系

多体のハミルトニアン



$$H = \sum_i T_i + \underbrace{\sum_{i < j} v_{ij}}_{\text{2体力}} + \underbrace{\sum_{i < j < k} v_{ijk}}_{\text{3体力}}$$

このハミルトニアンを核子間のパウリ原理を考慮してどのように(近似的に)解くのか？

核子多体問題



$$H = \sum_i T_i + \underbrace{\sum_{i<j} v_{ij}}_{\text{2体力}} + \underbrace{\sum_{i<j<k} v_{ijk}}_{\text{3体力}}$$

3体力:




2体力:

核子・核子散乱実験



現象論的ポテンシャル





最近では、格子QCDに基づく
核力ポテンシャルも

K. Sekiguchi et al.,
PRC89('14)064007

斥力芯→原子核の飽和性

斥力芯の起源

- クォーク間の
パウリ原理
- グルーオン交換力
(color magnetic interaction)



強いスピン・アイソスピン依存性:

$$V_C(r) = V_0(r) + V_\sigma(r)\boldsymbol{\sigma}_1 \cdot \boldsymbol{\sigma}_2 + V_\tau(r)\boldsymbol{\tau}_1 \cdot \boldsymbol{\tau}_2 + V_{\sigma\tau}(r)(\boldsymbol{\sigma}_1 \cdot \boldsymbol{\sigma}_2)(\boldsymbol{\tau}_1 \cdot \boldsymbol{\tau}_2)$$

+テンソル力、スピン軌道力、など

中間子交換ポテンシャル

$$\nabla^2 \phi(\mathbf{r}) = -4\pi \rho(\mathbf{r}) \rightarrow (\nabla^2 - k^2) \phi(\mathbf{r}) = 4\pi f \rho(\mathbf{r})$$

(湯川による拡張)

この解は、

$$\phi(\mathbf{r}) = -f \int d\mathbf{r}' \frac{\exp(-k|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|)}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \rho(\mathbf{r}')$$

点粒子であれば $\rho(\mathbf{r}') = \delta(\mathbf{r}') \rightarrow \phi(r) = -f \frac{e^{-kr}}{r}$ (湯川関数)

Klein-Gordon方程式:



$$\left(\nabla^2 - \frac{m^2 c^2}{\hbar^2} \right) \phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} \quad \rightarrow \quad k = \frac{mc}{\hbar}$$

$$\rightarrow \text{核力の到達距離: } R = k^{-1} = \frac{\hbar}{mc} \sim 1.4 \text{ fm}$$

$$m_{\rho}c^2=770 \text{ MeV}$$

$$m_{\omega}c^2=782 \text{ MeV}$$

$$m_{\sigma}c^2=400-550 \text{ MeV}$$



中間領域はより重い中間子(ρ 中間子など)の交換


$$R = k^{-1} = \frac{\hbar}{mc} \rightarrow \text{重い中間子はレンジが短い}$$

格子QCDによる核力


N. Ishii, S. Aoki, and T. Hatsuda,
Phys. Rev. Lett. 99 (2007) 022001

ベーテ・サルピータ振幅

$$G_{NN}(\mathbf{r}, t) = \langle 0 | N(\mathbf{r}, t) N(\mathbf{0}, t) \bar{J}_{\text{src}}(t = 0) | 0 \rangle$$




時間発展





$$-\frac{\hbar^2}{2\mu} \nabla^2 \psi(\mathbf{r}) + V(\mathbf{r}) \psi(\mathbf{r}) = E \psi(\mathbf{r})$$

$$\psi(\mathbf{r}) \equiv \lim_{t \rightarrow \infty} G_{NN}(\mathbf{r}, t)$$

を仮定してポテンシャル V を求める



格子QCDによる核力




N. Ishii, S. Aoki, and T. Hatsuda, Phys. Rev. Lett. 99 (2007) 022001

One-pion exchange potential (OPEP)

もう少し場の理論的にポテンシャルを求めると:

$$V(r) = -\frac{g^2}{4\pi}(\boldsymbol{\tau}_1 \cdot \boldsymbol{\tau}_2)(\boldsymbol{\sigma}_1 \cdot \boldsymbol{\nabla})(\boldsymbol{\sigma}_2 \cdot \boldsymbol{\nabla})\frac{e^{-\mu r}}{r}$$
$$\mu = m_\pi c/\hbar$$



$$= \frac{g^2}{4\pi}(\boldsymbol{\tau}_1 \cdot \boldsymbol{\tau}_2) \left[((\boldsymbol{\sigma}_1 \cdot \boldsymbol{\sigma}_2) + S_{12}Y_T(\mu r)) \frac{\mu^2 e^{-\mu r}}{3r} - \frac{4\pi}{3}(\boldsymbol{\sigma}_1 \cdot \boldsymbol{\sigma}_2)\delta(r) \right]$$

$$S_{12} = \frac{3(\boldsymbol{\sigma}_1 \cdot \mathbf{r})(\boldsymbol{\sigma}_2 \cdot \mathbf{r})}{r^2} - (\boldsymbol{\sigma}_1 \cdot \boldsymbol{\sigma}_2)$$

テンソル演算子

$$Y_T(\mu r) = \left(1 + \frac{3}{\mu r} + \frac{3}{\mu^2 r^2} \right)$$

テンソル力

$$S_{12} = \frac{3(\boldsymbol{\sigma}_1 \cdot \boldsymbol{r})(\boldsymbol{\sigma}_2 \cdot \boldsymbol{r})}{r^2} - (\boldsymbol{\sigma}_1 \cdot \boldsymbol{\sigma}_2)$$


$$\boldsymbol{S} = \boldsymbol{s}_1 + \boldsymbol{s}_2 = \frac{\hbar}{2}\boldsymbol{\sigma}_1 + \frac{\hbar}{2}\boldsymbol{\sigma}_2 \quad \text{を用いると}$$

$$S_{12} = \frac{2}{\hbar^2} \left[\frac{3(\boldsymbol{S} \cdot \boldsymbol{r})^2}{r^2} - (\boldsymbol{S})^2 \right] \quad \text{と書き直すことができる。}$$


$$\text{cf. } (\boldsymbol{\sigma} \cdot \boldsymbol{A})(\boldsymbol{\sigma} \cdot \boldsymbol{B}) = \boldsymbol{A} \cdot \boldsymbol{B} + i\boldsymbol{\sigma} \cdot (\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B})$$

→ $S=0$ ではゼロになる


古典的には:



$$S_{12} = -1$$



$$S_{12} = 2$$



$$S_{12} = 3\cos^2\theta - 1 \sim Y_{20}(\theta)$$

テンソル力

$$S_{12} = \frac{3(\boldsymbol{\sigma}_1 \cdot \boldsymbol{r})(\boldsymbol{\sigma}_2 \cdot \boldsymbol{r})}{r^2} - (\boldsymbol{\sigma}_1 \cdot \boldsymbol{\sigma}_2)$$

→ $S=0$ ではゼロになる

- ・重陽子 ($S=1$) が束縛し、nn ($S=0$) が束縛しない理由
- ・重陽子のD波成分(四重極モーメント)の説明(4%程度のD波成分)



アイソスピン

2核子系

スピン:

$$\mathbf{S} = \mathbf{s}_1 + \mathbf{s}_2$$

	$S = 1$	$S = 0$
$S_z = 1$	$ \uparrow\rangle \uparrow\rangle$	
$S_z = 0$	$\frac{1}{\sqrt{2}}(\uparrow\rangle \downarrow\rangle + \downarrow\rangle \uparrow\rangle)$	$\frac{1}{\sqrt{2}}(\uparrow\rangle \downarrow\rangle - \downarrow\rangle \uparrow\rangle)$
$S_z = -1$	$ \downarrow\rangle \downarrow\rangle$	

アイソスピン:

$$\mathbf{T} = \mathbf{t}_1 + \mathbf{t}_2$$

	$T = 1$	$T = 0$
$T_z = 1$	$ n\rangle n\rangle$	
$T_z = 0$	$\frac{1}{\sqrt{2}}(n\rangle p\rangle + p\rangle n\rangle)$	$\frac{1}{\sqrt{2}}(n\rangle p\rangle - p\rangle n\rangle)$
$T_z = -1$	$ p\rangle p\rangle$	

$$\Psi_{NN}(\mathbf{r}) = R_L(r) Y_{LM}(\hat{\mathbf{r}}) \chi_S \chi_T$$


2核子の入れ換え $\rightarrow (-1)^L$

$+1 (S=1)$	$+1 (T=1)$
$-1 (S=0)$	$-1 (T=0)$

$$2S+1 L_J \quad L=0 \text{なら}$$

$S \backslash T$	0	1
0	^1O	^1E
1	^3E	^3O


原子核の基本的な性質



$$H = \sum_i T_i + \underbrace{\sum_{i < j} v_{ij}}_{\text{2体力}} + \underbrace{\sum_{i < j < k} v_{ijk}}_{\text{3体力}}$$

原子核 = 陽子と中性子の多体系

- 基底状態のエネルギー(原子核の質量)?
- 多体系の大きさ(半径)?
- 基底状態の形(変形?)
- 励起スペクトル?
- 原子核と原子核を衝突させると何が起きる?



原子核 = 強い相互作用をする粒子(核子)の集合体

- 有限量子多体系
- 自己束縛系

安定な(自然界に存在する)原子核: 287 種類
現在までに確認された原子核: 約 3,000 種類
存在が予想されている原子核: 約 10,000 種類

原子核物理学 = これらの原子核の静的・動的性質を研究


粒子が多体系をつくることによって初めて現われる
豊富で多様な物理現象の解明 「量子多体論」

エネルギーと長さの典型的な大きさ: $\text{MeV} = 10^6 \text{ eV}$
 $\text{fm} = 10^{-15} \text{ m}$

$$\hbar c = 197.1 \text{ MeV fm}$$

核図表


陽子数




中性子数

横軸を中性子の数、縦軸を陽子の数にとった2次元マップ
(■は地球上に存在する安定な原子核)

核図表の拡大: 原子核物理のフロンティア



超重核




113 番元素
ニホニウム

一口一核

中性子過剰核(理研RIBF)

核図表

陽子数




中性子数



横軸を中性子の数、縦軸を陽子の数にとった2次元マップ
(■は地球上に存在する安定な原子核)

核図表



横軸を中性子の数、縦軸を陽子の数にとった2次元マップ
(■は地球上に存在する安定な原子核)

- $Z \sim 20$ くらいまでは $N \sim Z$
- $Z > 20$ になると $N > Z$

何でか分かりますか？

p-p間力

p-n間力

n-n間力

どれも同じ強さ？

n-n 束縛系なし

p-p 束縛系なし

n-p 束縛系あり(重陽子)

→ pn 間の引力がより強い

(量子力学:3次元ポテンシャルの束縛状態

←引力が強い場合のみ)

• 「Z ~ 20くらいまでは N ~ Z」になる理由(原子核の対称エネルギー)

2つの理由


1. 中性子間力や陽子間力よりも中性子－陽子間力の方が強い

cf. 重陽子

2. パウリ原理

$E_k = k \Delta E$ (縮退度 2) だとすると、

$$\begin{aligned} E &= \sum_{k=1}^{N/2} 2k\Delta E + \sum_{k=1}^{Z/2} 2k\Delta E \\ &= 2\Delta E \left(\sum_{k=1}^{N/2} k + \sum_{k=1}^{Z/2} k \right) \\ &= \frac{\Delta E}{2} \left(\frac{N^2 + Z^2}{2} + N + Z \right) \quad \leftarrow \sum_{k=1}^n k = \frac{1}{2}n(n+1) \\ &= \frac{\Delta E}{2} \left(\frac{A^2}{4} + A + \frac{1}{4} \cdot (N - Z)^2 \right) \end{aligned}$$



両方とも(同じ $A = N+Z$ であれば) $N \sim Z$ にした方が得する:「対称エネルギー」

- それでは、何故「 $Z > 20$ では $N > Z$ 」となるか？

クーロン力の影響

pp, pn, nn : 核力(強い引力)


pp: +クーロン力(斥力)



中性子の数を増やして引力をかせぐ
(クーロン斥力を打ち消す)

対称エネルギーでは損をするが、トータル
としては得をする。

原子核の質量



$$m(N, Z)c^2 = Zm_pc^2 + Nm_nc^2 - B$$


束縛エネルギー

* 束縛エネルギーが大きいほど安定(質量が軽い)


cf. 2粒子系の場合(例えば水素原子=陽子+電子):




$$M c^2 = m_1 c^2 + m_2 c^2 - B$$




2粒子がバラバラの
状態に比べて B だけ
エネルギーが下がる
(束縛している)



B/A (核子1つあたりの平均的な束縛エネルギー)
の実験データ



- 軽い核は核融合した方が安定
- 重い核は核分裂した方が安定




1. $B(N,Z)/A \sim 8.5$ MeV ($A > 12$) (ほぼ一定) ← 短距離力(核子間相互作用)

もし全ての核子と相互作用するとなると(長距離力)


$$B \propto A(A-1)/2 \rightarrow B/A \propto A \quad \text{となるはず。。。。}$$


もし、それぞれの核子が近くの α 個の粒子とだけ相互作用するとしたら:

$$B \sim \alpha A/2 \longrightarrow B/A \sim \alpha/2 \text{ (const.)}$$




$$\alpha = \frac{4\pi}{3} r_{\text{int}}^3 \cdot \rho$$





1. $B(N,Z)/A \sim 8.5 \text{ MeV} (A > 12) \iff$ 短距離力(核子間相互作用)
2. 重い原子核に対してはクーロン力の影響
 - $\longleftarrow B/A$ が A に比例して減少
(長距離力(クーロン力)がはたらいっている証拠)



1. $B(N,Z)/A \sim 8.5 \text{ MeV} (A > 12) \iff$ 短距離力(核子間相互作用)
2. 重い原子核に対してはクーロン力の影響
 - $\longleftarrow B/A$ が A に比例して減少
(長距離力(クーロン力)がはたらいっている証拠)


もし、それぞれの核子が近くの α 個の粒子とだけ相互作用するとしたら:

$$B \sim \alpha A/2 \longrightarrow B/A \sim \alpha/2 \text{ (const.)}$$


もし、それぞれの核子が近くの α 個の粒子とだけ相互作用するとしたら:

$$B \sim \alpha A/2 \longrightarrow B/A \sim \alpha/2 \text{ (const.)}$$

小さな原子核だと




$$\alpha = \frac{4\pi}{3} r_{\text{int}}^3 \cdot \rho$$




もし、それぞれの核子が近くの α 個の粒子とだけ相互作用するとしたら:

$$B \sim \alpha A/2 \longrightarrow B/A \sim \alpha/2 \text{ (const.)}$$




$$\alpha = \frac{4\pi}{3} r_{\text{int}}^3 \cdot \rho$$

小さな原子核だと




$$\rightarrow B/A \propto A - 1$$




もし、それぞれの核子が近くの α 個の粒子とだけ相互作用するとしたら:

$$B \sim \alpha A/2 \longrightarrow B/A \sim \alpha/2 \text{ (const.)}$$




$$\alpha = \frac{4\pi}{3} r_{\text{int}}^3 \cdot \rho$$


小さな原子核だと




$$\rightarrow B/A \propto A - 1$$



核力



クーロン力



B/A




$\rightarrow B/A \propto A - 1$




$\alpha+1$

A

核力




クーロン力




B/A

$$\rightarrow B/A \propto A - 1$$




核力のレンジの見積もり





$$\alpha = \frac{4\pi}{3} r_{\text{int}}^3 \cdot \rho$$

小さな原子核だと



$$\rightarrow B/A \propto A - 1$$





この図から α の値を読み取ると、
 $\alpha \sim 10$ くらい。




核力の到達距離は、
 $1.1 \times 10^{1/3} = 2.37 \text{ fm}$ 程度。


湯川相互作用:

$$v(r) = -g \frac{e^{-\kappa r}}{r}$$

$$\frac{1}{\kappa} = \frac{\hbar}{m_{\pi} c} = 1.41 \text{ fm}$$



電荷分布： $R \sim 1.1A^{1/3}$ fm の根拠



ボルン近似:



高エネルギー
電子散乱

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{Z_P^2 e^4}{(4E \sin^2 \theta/2)^2} |F(q)|^2$$

形状因子 (form factor)

$$F(q) = \int e^{-i\mathbf{q} \cdot \mathbf{r}} \rho(r) dr$$

(密度のフーリエ変換)


電子と原子核の相互作用:

$$V(\boldsymbol{r}) = - \int d\boldsymbol{r}' \rho_{\text{ch}}(\boldsymbol{r}') \frac{e^2}{|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}'|}$$

$$\text{(note)} \quad \nabla^2 V(\boldsymbol{r}) = 4\pi e^2 \rho_{\text{ch}}(\boldsymbol{r})$$

$$\begin{aligned} M_{fi} &= \langle \psi_f | V | \psi_i \rangle = \int d\boldsymbol{r} \psi_f^*(\boldsymbol{r}) V(\boldsymbol{r}) \psi_i(\boldsymbol{r}) \\ &= \int d\boldsymbol{r} e^{i(\boldsymbol{k}_i - \boldsymbol{k}_f) \cdot \boldsymbol{r}} V(\boldsymbol{r}) \equiv \int d\boldsymbol{r} e^{-i\boldsymbol{q} \cdot \boldsymbol{r}} V(\boldsymbol{r}) \\ &= -\frac{4\pi e^2}{q^2} \int d\boldsymbol{r} e^{-i\boldsymbol{q} \cdot \boldsymbol{r}} \rho_{\text{ch}}(\boldsymbol{r}) \end{aligned}$$


(部分積分2回)



フェルミ分布

$$\rho(r) = \frac{\rho_0}{1 + \exp[(r - R_0)/a]}$$

$$\rho_0 \sim 0.17 \text{ (fm}^{-3}\text{)} \quad \leftarrow$$

原子核の
飽和性

$$R_0 \sim 1.1 \times A^{1/3} \text{ (fm)}$$

$$a \sim 0.57 \text{ (fm)}$$

cf. 核子の感じるポテンシャルも同じような形。下から軌道を詰めて
いくとフェルミ・エネルギーは約 -8.5 MeV ←核子1個あたりの束縛エネルギー
→ ポテンシャルの深さはフェルミガス近似で見積もれる