

r-プロセス元素合成と中性子過剰核

1. 重元素の合成: s-プロセスと r-プロセス
2. r-プロセスと原子核物理
 - 核図表
 - β 崩壊
 - 魔法数
3. 中性子過剰核の物理

元素の周期表

Group →	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
↓ Period																		
1	1 H																	2 He
2	3 Li	4 Be											5 B	6 C	7 N	8 O	9 F	10 Ne
3	11 Na	12 Mg											13 Al	14 Si	15 P	16 S	17 Cl	18 Ar
4	19 K	20 Ca	21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn	31 Ga	32 Ge		113 Nh nihonium	115 Mc moscovium	
5	37 Rb	38 Sr	39 Y	40 Zr	41 Nb	42 Mo	43 Tc	44 Ru	45 Rh	46 Pd	47 Ag	48 Cd	49 In	50 Sn				
6	55 Cs	56 Ba	57 La *	72 Hf	73 Ta	74 W	75 Re	76 Os	77 Ir	78 Pt	79 Au	80 Hg	81 Tl	82 Pb		117 Ts tennessine	118 Og oganesson	
7	87 Fr	88 Ra	89 Ac *	104 Rf *	105 Db *	106 Sg *	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113 Nh	114 Fl				
				58 Ce *	59 Pr *	60 Nd *	61 Pm *	62 Sm *	63 Eu *	64 Gd *	65 Tb *	66 Dy *	67 Ho *	68 Er *	69 Tm *	70 Yb *	71 Lu *	
				90 Th *	91 Pa *	92 U *	93 Np *	94 Pu *	95 Am *	96 Cm *	97 Bk *	98 Cf *	99 Es *	100 Fm *	101 Md *	102 No *	103 Lr *	

地球上のすべての物質は元素からできている

→ 元素はどのようにして出来たのか(元素合成)?

元素はどのように出来たのか?

→ 宇宙でうまれた




ビッグバン
(138億年前)



Li

Li がほんの少ししか
できなかったわけ

B(ホウ素)までの安定な原子核



元素の宇宙存在比(質量比)

H	70.7%	Be	< 0.00001%
He	27.4%	B	< 0.00001%
Li	< 0.00001 %	C	0.3 %

元素はどのように出来たのか？

→ 宇宙で生まれた



ビッグバン
(138億年前)



Li

「僕たちの体の中の水素は
138億歳。

つまり、ビッグバンの時に
できた水素が巡り巡って
僕たちの体の中にある。」



「知ろうとすること。」
早野龍五、糸井重里 著
新潮文庫


元素はどのように出来たのか？

Feまでの元素の起源



(大質量)星の内部での核融合反応



————→ 恒星が光っているもと




元素の宇宙存在比(質量比)

H	70.7%	Be	< 0.00001%
He	27.4%	B	< 0.00001%
Li	< 0.00001 %	C	0.3 %

トリプル・アルファ反応



トリプル・アルファ反応




7.37 MeV
 $\alpha + {}^8\text{Be}$


7.65 MeV
 0_2^+

ホイル
 状態

0_1^+
 ${}^{12}\text{C}$




ホイル: ${}^{12}\text{C}$ の共鳴状態の存在
 を予言 (1952年)



元素はどのように出来たのか？


Feまでの元素の起源



(大質量)星の内部での核融合反応
→ 恒星が光っているもと

- Feまでは発熱反応
- Feから先は吸熱反応


核子あたりの束縛エネルギー(実験データ)




- Feまでは核融合は発熱反応
- Feから先は吸熱反応

→ 核融合は鉄(Fe)で止まる

核融合が Fe で止まると何が起こるか？




(大質量)星の内部での核融合反応



核融合の燃料がなくなると

- ✓ 重力により縮む
- ✓ 耐えられなくなると爆発
(超新星爆発)



O

Mg

Ti



N

Ca



Fe

C





Li

Si



超新星爆発により
元素が宇宙空間に
ばらまかれる

サイクルのくりかえし



星間ガス


星の形成

超新星爆発



元素はどのように出来たのか？

Feまでの元素の起源



(大質量)星の内部での核融合反応
————→ 恒星が光っているもと

- Feまでは発熱反応
- Feから先は吸熱反応


————→ 核融合は鉄(Fe)で止まる

鉄より重い元素(例えば鉛など)は
どのように出来たのか？

元素はどのように出来たのか？

中性子の吸収
(電荷がないので吸収されやすい)

⇒ 2つのプロセス




赤色巨星



s-プロセス

Ba, La, Pb, Bi など



超新星爆発や
中性子星の合体




r-プロセス

Th, Eu, U など



s-プロセス元素合成と r-プロセス元素合成

中性子吸収(捕獲)反応




(n, γ) 反応

核図表上では:




$^{114}\text{Cd} \rightarrow ^{115}\text{Cd}$ の次は何が起こる?




^{114}Cd : 安定同位体

^{115}Cd : 2.33 日の半減期で β 崩壊




$^{114}\text{Cd} \rightarrow ^{115}\text{Cd}$ の次は2つの可能性

✓ 中性子吸収が遅い場合




中性子吸収の
前にβ崩壊




s-プロセス
(slow process)

✓ 中性子吸収の方が速い場合




β崩壊が起きる
前に中性子を
吸収



r-プロセス
(rapid process)


元素の宇宙存在比



Bohr-Mottelson,
“Nuclear Structure”

s-プロセスによるピークとr-プロセスによるピークの2種類のピーク


s-プロセス元素合成



赤色巨星などの中で
核図表の安定同位体をたどりながら
ゆっくりと進行

s-プロセス元素合成


s-プロセスの終点




s-プロセスは ^{209}Bi まで

s-プロセス元素合成

s-プロセスの終点




s-プロセスは ^{209}Bi まで




ウランやトリウムは s-プロセス
では作られない
→ r-プロセス


r-プロセス元素合成




r-プロセス元素合成





β 崩壊:



r-プロセス元素合成の動画




和南城伸也氏(上智大)



r-プロセスのピークが左側
 にくるのは中性子過剰領域
 を通るため


中性子捕獲と光分解

r-プロセスでは光分解反応も重要



中性子捕獲反応と逆過程

✓ 中性子過剰核 = 弱束縛 → 分解しやすい




中性子捕獲と光分解

r-プロセスでは光分解反応も重要




- ✓ 中性子過剰核 = 弱束縛 → 分解しやすい
- ✓ r-プロセスは比較的高温の環境下で起こる
→ 高エネルギーの光子が存在




(n, γ) 過程と (γ, n) 過程が近似的に化学平衡


滞留核




(n, γ) 反応の確率が小さくなるとそこで止まる



β 崩壊で違う元素になる




滞留核




どういところで r-プロセスは滞留するか?

→ 魔法数を持つ原子核は中性子吸収の確率が小さい

中性子捕獲断面積




原子核の中で核子の 感じるポテンシャル





準位が埋まってエネルギーの
ギャップが開くと安定
= 閉殻構造

Sn同位体の一中性子 分離エネルギー





N=83から上の準位が詰まる
→ 中性子をとりのぞくのにエネ
ルギーが小さくてすむ

閉殻核+1中性子では:




閉殻核+1中性子では:

中性子捕獲断面積



K.S. Krane, "Introductory Nuclear Physics"




s-プロセスに比べて r-プロセスにはよくわかっていないことが多い




→ 金やウランがどうやって出来たのかは実はあまりよくわかっていない。

r-プロセス元素合成の謎

➤ r-プロセスのサイトはどこか？



超新星爆発



中性子星の合体：最近の有力な説

星の合体 重力波で観測

発生源からの光も確認

地球から1・3億光年離れた二つの「中性子星」が合体した様子も、重力波と光で観測することに成功したと、米欧の研究グループが16日、発表した。宇宙のかなたからやってくる重力波を手がかりに、望遠鏡などで光をとらえたのは世界で初めて。天文観測の新たな手法として期待される。

重力波は、ブラックホールのような重い天体が動いた際に生じる時空のゆがみ。光速でさざ波のように広がる。2015年に初めて検出された。観測への応用も期待されていたが、過去4回検出された重力波はいずれも、光を吸収するブラックホール同士の合体で生じたため観測できなかった。

米欧の研究グループ発表


子星（質量は太陽の1・2倍×1・6倍）が一つに合体した際に生じた。この重力波は8月17日、米の観測施設「LIGO」とイタリアの「Virgo」とイタリヤの「VIRGO」で検出。可視光やガンマ線など従来の方法でも観測できる中性子星から発せられた可能性があるため、研究チームは世界の天文台に観測を呼びかけた。

日本を含む約70カ所で望遠鏡などを使い、重力波がやってきた方向を調べたところ、重力波の検出から約11時間後、南米チリの望遠鏡で中性子星からの光をとらえた。光は弱まりながら約3週間観測できた。広島宇宙科学センターの内海洋輔特任助教は「今回の成果は、重力波も使って観測する新たな天文学の幕開け。日本の重力波観測施設「KAGRA」が稼働すれば、さらに精度が高まるだろう」と話している。（田中誠士、斎藤義浩）

今年ノーベル物理学賞の受賞が決まった米国のチームは、世界90以上の観測チームに重力波の検出を知らせる態勢を整えており、今回は日本を含む70以上の天文台が観測に参加した。重力波を併用した観測の登場で、宇宙物理学の新たな時代が始まった。（小林悠）

中性子星

原子核を構成する基本粒子の「中性子」がぎっしり詰まった天体。質量が大きい恒星が一生を終える際、原子が強く圧縮されてできる。理論的には、茶さじ1杯分の質量が10億ト程度になっている。中性子星よりさらに質量が大きい天体は、光さえも外に出られないブラックホールとされる。



2017年(平成29年)
10月17日
火曜日



天気	6	9	12	15	18	21(時)
青森	☀	☀	☁	☁	☁	50
盛岡	☀	☀	☀	☀	☀	17
秋田	☀	☀	☀	☀	☀	17
山形	☀	☀	☀	☀	☀	10
仙台	☀	☀	☀	☀	☀	19
福島	☀	☀	☀	☀	☀	9
新潟	☀	☀	☀	☀	☀	17
長野	☀	☀	☀	☀	☀	10
東京	☀	☀	☀	☀	☀	20

朝日新聞東京本社
〒104-8011東京都中央区築地5-3-2 電話03-3545-0131 www.asahi.com

本日の編集長—山之上玲子


信頼の技術を、
医薬品に。

信頼の医療機器・医薬品


NIPRO

2017衆院選 投票まで 5日

改憲への動きシミュレーション	2面
安倍政治 その先⑥ 核政策	3面
原発再稼働 争点化の攻防	4面
金融緩和 語られない「出口」	7面
社説 教育無償化／知る権利	14面
耕論 社会保障は国難か	15面
届いていますか④ 独身女性	29面
裁判官の過去判断チェック	34面
改憲 触れる人触れない人	35面




国立天文台




重力波源から来た電磁波(の時間変化)


2017.08.18-19



2017.08.24-25



田中雅臣准教授
(天文専攻)



実線:r-プロセスが起こった
場合


破線:起こらなかった場合

M. Tanaka et al.,
Astron. Soc. Jpn. 69 ('17) 102


<http://www.cfca.nao.ac.jp/pr/20171016>

中性子星合体 → 高密度核物質の情報

Λ : deformability of neutron star (GW $\rightarrow \Lambda < 800$)




F.J. Fattoyev, J. Piekarewicz,
and C.J. Horowitz,
PRL120 ('18) 172702




E. Annala, T. Gorda, A. Kurkela,
and A. Vuorinen,
PRL120 ('18) 172703

r-プロセス元素合成の謎

➤ r-プロセスのサイトはどこか?




超新星爆発




中性子星の合体: 最近の有力な説

➤ 中性子過剰核の核分裂の果たす役割? 超重元素?


- 自発核分裂及び中性子誘起核分裂
- β 遅延核分裂






r-プロセス元素合成の謎

➤ r-プロセスのサイトはどこか?



超新星爆発



中性子星の合体: 最近の有力な説


➤ 中性子過剰核の核分裂の果たす役割? 超重元素?

- 自発核分裂及び中性子誘起核分裂
- β 遅延核分裂

➤ 中性子過剰核の性質をどのくらいよくわかっているのか?

- 質量
- β 崩壊半減期
- 魔法数



中性子過剰核の物理



r-プロセス元素合成以外にも量子多体系として豊富な物理

- ✓ 陽子・中性子数の人工的制御によって原子核の新しい形態を明らかにする

ハロー核の発見: 相互作用断面積測定 (1985)




I. Tanihata et al., PRL55('85)2676

2つの原子核が重なった時に
反応が起こるとすると


$$\sigma_I \sim \pi [R_I(P) + R_I(T)]^2$$

$$\longrightarrow R_I(P)$$




1中性子ハロ一核

典型的な例： $^{11}_4\text{Be}_7$



I. Tanihata et al.,
PRL55('85)2676; PLB206('88)592

1中性子分離エネルギー



$$S_n = 504 \pm 6 \text{ keV}$$



非常に小さい

ちなみに ^{13}C では、
 $S_n = 4.95 \text{ MeV}$


1 中性子ハロー核

1 中性子分離エネルギー

典型的な例： $^{11}_4\text{Be}_7$



解釈： ^{10}Be のまわりに1つの中性子が弱く束縛され薄く広がっている




$$\psi(r) \sim \exp(-\kappa r) \quad \kappa = \sqrt{2m|\epsilon|/\hbar^2}$$

弱く束縛された系



密度分布の空間的広がり(ハロー構造)

解釈: ^{10}Be のまわりに1つの中性子が弱く束縛され薄く広がっている



$$\psi(r) \sim \exp(-\kappa r) \quad \kappa = \sqrt{2m|\epsilon|/\hbar^2}$$

弱く束縛された系




密度分布の空間的広がり(ハロー構造)

反応断面積の実験値を説明する
密度分布




月暈(月のまわりに広がる
薄い輪。ハロー。)




ボロミアン原子核

残留相互作用 → 引力



不安定

安定



“ボロミアン核”

ボロミアン核の構造


- ✓ 多体相関のため non-trivial
- ✓ 多くの注目を集めている

中性子過剰核と理研 RIBF

- 中性子過剰核の性質をどのくらいよくわかっているのか?
質量、 β 崩壊半減期、魔法数など


理研RIBF: 世界最大強度で中性子過剰核を作り出す施設

RI 「放射性同位元素 (RI)」を
B 「ビーム」としてとりだし
F 「ファクトリー」のように大量生産する。




2007年始動

RIBF による原子核ワールドの拡張




r-プロセス経路の内側にある中性子過剰核を網羅できる

多くの中性子過剰核のβ崩壊寿命の系統的測定






従来の理論的
見積もりより
30%程度早く
崩壊する


S. Nishimura et al., PRL106('11)052502; PRL114('15)192501;
 PRL118('17)072701



S. Nishimura et al., PRL106('11)052502; PRL114('15)192501;
PRL118('17)072701

変化する魔法数






RIBF での実験の成果

魔法数 $N=20, 28$ の喪失
 新魔法数 $N=34$ の出現
 など。

より重い領域でどうなるか？

RIBF物理の大きな柱の一つ



Nature, vol. 502 (2013)
 新魔法数 $N=34$ の発見