

超重元素の物理

元素の周期表

Group → 1 ↓ Period	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	1 H																2 He		
2	3 Li	4 Be											5 B	6 C	7 N	8 O	9 F	10 Ne	
3	11 Na	12 Mg											13 Al	14 Si	15 P	16 S	17 Cl	18 Ar	
4	19 K	20 Ca	21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn	31 Ga	32 Ge	33 As	34 Se	35 Br	36 Kr	
5	37 Rb	38 Sr	39 Y	40 Zr	41 Nb	42 Mo	43 Tc	44 Ru	45 Rh	46 Pd	47 Ag	48 Cd	49 In	50 Sn	51 Sb	52 Te	53 I	54 Xe	
6	55 Cs	56 Ba	57 La	*	72 Hf	73 Ta	74 W	75 Re	76 Os	77 Ir	78 Pt	79 Au	80 Hg	81 Tl	82 Pb	83 Bi	84 Po	86 Rn	
7	87 Fr	88 Ra	89 Ac	*	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113 Nh	114 Fl	115 Mc	116 Lv	117 Ts	118 Og
	*	58 Ce	59 Pr	60 Nd	61 Pm	62 Sm	63 Eu	64 Gd	65 Tb	66 Dy	67 Ho	68 Er	69 Tm	70 Yb	71 Lu				
	*	90 Th	91 Pa	92 U	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr				

一番重い元素は何？

元素の周期表

Group → 1 ↓ Period	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	1 H																2 He		
2	3 Li	4 Be											5 B	6 C	7 N	8 O	9 F	10 Ne	
3	11 Na	12 Mg											13 Al	14 Si	15 P	16 S	17 Cl	18 Ar	
4	19 K	20 Ca	21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn	31 Ga	32 Ge	33 As	34 Se	35 Br	36 Kr	
5	37 Rb	38 Sr	39 Y	40 Zr	41 Nb	42 Mo	43 Tc	44 Ru	45 Rh	46 Pd	47 Ag	48 Cd	49 In	50 Sn	51 Sb	52 Te	53 I	54 Xe	
6	55 Cs	56 Ba	57 La	*	72 Hf	73 Ta	74 W	75 Re	76 Os	77 Ir	78 Pt	79 Au	80 Hg	81 Tl	82 Pb	83 Bi	84 Po	86 Rn	
7	87 Fr	88 Ra	89 Ac	*	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113 Nh	114 Fl	115 Mc	116 Lv	117 Ts	118 Og
	*	58 Ce	59 Pr	60 Nd	61 Pm	62 Sm	63 Eu	64 Gd	65 Tb	66 Dy	67 Ho	68 Er	69 Tm	70 Yb	71 Lu				
	*	90 Th	91 Pa	92 U	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr				

一番重い元素は何?

自然界にある元素: Pu (Z=94) → 自然界に極微量ある
 U (Z=92) 何がこの番号を決めているのか??

Lanthanides	57 La	58 Ce	59 Pr	60 Nd	61 Pm	62 Sm	63 Eu	64 Gd	65 Tb	66 Dy	67 Ho	68 Er	69 Tm	70 Yb	71 Lu
Actinides	89 Ac	90 Th	91 Pa	92 U	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr


自然界にある元素: Pu (Z=94) → 自然界に極微量ある
U (Z=92)

何がこの番号を決めているのか??


重い原子核 → 大きなクーロン反発




α崩壊に対して不安定



1 Ångstrom (= 100,000 Fermi)




(Z,N)





(Z-2,N-2)

+



(Z=2,N=2)

重い原子核の半減期



$^{232}\text{Th} \ 1.405 \times 10^{10} \text{ years}$

$^{238}\text{U} \ 4.468 \times 10^9 \text{ years}$

$^{244}\text{Pu} \ 8.08 \times 10^7 \text{ years}$

$^{247}\text{Cm} \ 1.56 \times 10^7 \text{ years}$

元素の周期表

Group → 1 ↓ Period	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	1 H																2 He		
2	3 Li	4 Be											5 B	6 C	7 N	8 O	9 F	10 Ne	
3	11 Na	12 Mg											13 Al	14 Si	15 P	16 S	17 Cl	18 Ar	
4	19 K	20 Ca	21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn	31 Ga	32 Ge	33 As	34 Se	35 Br	36 Kr	
5	37 Rb	38 Sr	39 Y	40 Zr	41 Nb	42 Mo	43 Tc	44 Ru	45 Rh	46 Pd	47 Ag	48 Cd	49 In	50 Sn	51 Sb	52 Te	53 I	54 Xe	
6	55 Cs	56 Ba	57 La	*	72 Hf	73 Ta	74 W	75 Re	76 Os	77 Ir	78 Pt	79 Au	80 Hg	81 Tl	82 Pb	83 Bi	84 Po	85 At	86 Rn
7	87 Fr	88 Ra	89 Ac	104 Rf	105 Db	106 Sq	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113 Nh	114 Fl	115 Mc	116 Lv	117 Ts	118 Og	
* 58 Ce * 59 Pr * 60 Nd * 61 Pm * 62 Sm * 63 Eu * 64 Gd * 65 Tb * 66 Dy * 67 Ho * 68 Fr * 69 Tm * 70 Yb * 71 Lu * 90 Th * 91 Pa * 92 U * 93 Np * 94 Pu * 95 Am * 96 Cm * 97 Bk * 98 Cf * 99 Es * 100 Fm * 101 Md * 102 No * 103 Lr																			

人工元素

← 原子核反応

超重元素

(アクチナイド以降の元素)



超重元素の核融合反応

113番元素: ニホニウムNh



A detailed periodic table showing element symbols and atomic numbers from 1 to 118. The table includes groups 1 through 18 and periods 1 through 7. A red box highlights the position of Nihonium (Nh) in the 11th column of the 7th period.


2016年11月



重イオン核融合反応

wikipedia

安定の島の予言:超重元素探索の重要な動機





安定の島: $Z=114, N=184$ の周辺


W.D. Myers and W.J. Swiatecki (1966), A. Sobiczewski et al. (1966)

Yuri Oganessian

殻エネルギー




N or $Z = 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126$ で束縛が大(魔法数)



Z. Patyk et al. NPA491('89)267

殼効果(変形魔法数)により核分裂障壁が高くなり安定化

安定の島(超重元素)を目指して



Yuri Oganessian

who is she?

Fr	Ra	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Ds	Rg	Cn	Uut	Fl	Uup	Lv	Uus	Uuo
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	----	-----	----	-----	-----


Z=110	Darmstadtium (Ds)	1994	Germany
Z=111	Roentgenium (Rg)	1994	Germany
Z=112	Copernicium (Cn)	1996	Germany
Z=113	Nihonium (Nh)	2003	Russia / 2004 Japan
Z=114	Flerovium (Fl)	1999	Russia
Z=115	Moscovium (Mc)	2003	Russia
Z=116	Livermorium (Lv)	2000	Russia
Z=117	Tennessine (Ts)	2010	Russia
Z=118	Oganesson (Og)	2002	Russia



ドイツ、日本: 冷たい融合反応 (cold fusion)
ロシア: 熱い融合反応 (hot fusion)

ドイツ、日本: 冷たい融合反応 (cold fusion)

ロシア: 熱い融合反応 (hot fusion)



	Hot Fusion	Cold Fusion
例	$^{48}\text{Ca} + ^{243}\text{Am} \rightarrow ^{287}\text{Nh} + 4\text{n}$	$^{70}\text{Zn} + ^{209}\text{Bi} \rightarrow ^{278}\text{Nh} + 1\text{n}$
非対称度	大	小


熱い複合核

冷たい複合核

どうやって超重核を作る?

核融合反応


- 中重核の核融合反応:




どうやって超重核を作る?


核融合反応

- 中重核の核融合反応:



- 重核や超重核の核融合反応:






C.-C. Sahm et al.,
Z. Phys. A319('84)113

(復習)

$$B(N, Z) = a_v A - a_s A^{2/3} - a_C \frac{Z^2}{A^{1/3}} - a_{\text{sym}} \frac{(N - Z)^2}{A}$$

原子核を体積一定のまま変形してみる

例) 回転楕円体



$$a = R \cdot (1 + \epsilon)$$

$$b = R \cdot (1 + \epsilon)^{-1/2}$$

$$ab^2 = R^3 = \text{一定}$$


変形したときのエネルギー変化:

- 体積項、対称エネルギー項: 変化せず
 - クーロン項
 - 表面項
- } 変化

$\left. \begin{array}{l} \text{表面項} \\ \text{クーロン項} \end{array} \right\} \rightarrow \begin{array}{l} \text{球形になる傾向} \\ \text{変形になる傾向} \end{array} \right\} \rightarrow 2\text{つの力の競合}$

(復習)

$$\Delta E = E_S^{(0)} \left\{ \frac{2}{5}(1-x)\epsilon^2 - \frac{4}{105}(1+2x)\epsilon^3 + \dots \right\}$$



$$x \equiv \frac{E_C^{(0)}}{2E_S^{(0)}} = \frac{a_C}{2a_S} \cdot \frac{Z^2}{A} \sim \frac{1}{53.3} \cdot \frac{Z^2}{A}$$


$$E_B = \frac{98}{15} \cdot \frac{(1-x)^3}{(1+2x)^2} \cdot E_S^{(0)}$$

重い核ほど障壁は低くなる

$$\epsilon_B = 7 \cdot \frac{(1-x)}{(1+2x)}$$

重い核ほど障壁での変形度
は小さくなる


同じ原子核が接触すると:





$$a = R_0 \cdot (1 + \epsilon)$$
$$b = R_0 \cdot (1 + \epsilon)^{-1/2}$$

$$\frac{a}{b} \sim \frac{2R}{R} = 2 \rightarrow \epsilon \sim 0.587$$


同じ原子核が接触すると：




$$\frac{a}{b} \sim \frac{2R}{R} = 2 \rightarrow \epsilon \sim 0.587$$




$$a = R_0 \cdot (1 + \epsilon)$$
$$b = R_0 \cdot (1 + \epsilon)^{-1/2}$$




超重元素領域における重イオン核融合反応



超重元素領域における重イオン核融合反応



超重元素領域における重イオン核融合反応




*どのように核融合反応断面積を測定するのか?

➤ 中重核領域の場合:

✓ 核融合生成物の直接測定(蒸発残留核+核分裂)

➤ 重核・超重核領域の場合:




大きな準核分裂の確率のため、核分裂片の測定は複合核形成を意味しない(QFとFFの区別は実験的に困難)

↓
蒸発残留核の測定をもって複合核形成とみなす


重い複合核:
圧倒的な確率で核分裂
(例: $^{58}\text{Fe} + ^{208}\text{Pb}$ 反応では
核分裂しない確率は
 $P_{\text{suv}} \sim 10^{-6}$ 程度)

準核分裂+生き残りの2重苦

Ni + Pb 反応における典型的な値



理論的取り扱い



結合チャンネル法


ランジュバン法

統計模型

CN = compound nucleus
ER = evaporation residue

$$\sigma_{ER}(E) = \frac{\pi}{k^2} \sum_l (2l + 1) T_l(E) P_{CN}(E, l) W_{SUV}(E^*, l)$$

ランジュバン法



熱的なゆらぎ


→ ランジュバン法
(ブラウン運動)

$$m \frac{d^2q}{dt^2} = -\frac{dV(q)}{dq} - \gamma \frac{dq}{dt} + R(t)$$

γ : friction coefficient
 $R(t)$: random force

多次元化

- q :
 - ・核間距離
 - ・変形
 - ・フラグメントの質量




理論: ランジュバン法

multi-dimensional extension of:

$$m \frac{d^2 q}{dt^2} = -\frac{dV(q)}{dq} - \gamma \frac{dq}{dt} + R(t)$$




$E^* = 33 \text{ MeV}$






γ : friction coefficient

$R(t)$: random force

Ni + Pb 反応における典型的な値




Ni + Pb 反応における典型的な値



実験で観測されるもの

CN = compound nucleus
ER = evaporation residue





	Hot Fusion	Cold Fusion
Example	$^{48}\text{Ca} + ^{243}\text{Am} \rightarrow ^{287}\text{Nh} + 4\text{n}$	$^{70}\text{Zn} + ^{209}\text{Bi} \rightarrow ^{278}\text{Nh} + 1\text{n}$
asymmetry	large	small
Capture	large	small
Survival	small	large

$$\sigma \sim \text{fb} = 10^{-39} \text{ cm}^2$$

RIKEN (Cold fusion)

3rd event Aug. 14 2012

known nuclides






Dubna (Hot fusion)

$$\sigma \sim \text{pb} = 10^{-36} \text{ cm}^2$$

cf. Cold Fusion:
既知核とつながる
(不定性がより少ない)

Hot Fusion:
より中性子過剰な複合核
が作れる。




新元素113番 ニホニウム(Nh)





553日間の実験で
たったの3例の発見

→ 日本に命名権
ニホニウム Nh

熱い融合と冷たい融合：断面積の比較




熱い融合反応: ^{48}Ca +actinides




119番及び120番元素に向けて

^{48}Ca を使った熱い融合反応:




短寿命 → 標的にできるほど大量に
ない



二重閉殻 → 開殻

どのくらい断面積は
影響を受けるのか?

安定の島に向けて



中性子過剰核ビームが必須

- 低いビーム強度をどうするか?
- 中性子過剰核を用いた核反応のダイナミックス?
 - ✓ 分解や多核子移行反応
 - ✓ 原子核の形状の時間発展中の中性子放出
 - ✓ 統計模型はどれだけいいのか?

中性子過剰核の構造

課題はいっぱい


超重元素の化学

Group →	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
↓ Period																			
1	H												B	C	N	O	F	He	
2	Li	Be											Al	Si	P	S	Cl	Ne	
3	Na	Mg											In	Ge	As	Se	Br	Ar	
4	K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Sn	Sb	Te	I	Kr	
5	Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	Xe		
6	Cs	Ba	La	*	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	Rn	
7	Fr	Ra	Ac	*	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118
				*	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Ds	Rg	Cn	Nh	Fl	Mc	Lv	Ts	Og
				*	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	
				*	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu	
				*	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	
				*	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	S	Fm	Md	No	Lr	

➤本当にここに置いちゃっていいの?
 ➤NhはBやAlなどと同じ性質?

相対論的効果：原子番号の大きい元素で重要

$$E = mc^2$$



ディラック方程式(相対論的量子力学)を解くと、
原子中の電子のエネルギーは、

$$E_{1S} = mc^2 \sqrt{1 - (Z\alpha)^2} \sim mc^2 \left(1 - \frac{(Z\alpha)^2}{2} - \frac{(Z\alpha)^4}{8} + \dots \right)$$

相対論的効果


相対論的効果で有名な例: 金の色

1	1 H															2 He			
2	3 Li	4 Be																	
3	11 Na	12 Mg																	
4	19 K	20 Ca	21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn	31 Ga	32 Ge	33 As	34 Se	35 Br	36 Kr	
5	37 Rb	38 Sr	39 Y	40 Zr	41 Nb	42 Mo	43 Tc	44 Ru	45 Rh	46 Pd	47 Ag	48 Cd	49 In	50 Sn	51 Sb	52 Te	53 I	54 Xe	
6	55 Cs	56 Ba	57 La	*	72 Hf	73 Ta	74 W	75 Re	76 Os	77 Ir	78 Pt	79 Au	80 Hg	81 Tl	82 Pb	83 Bi	84 Po	85 At	86 Rn
7	87 Fr	88 Ra	89 Ac	*	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113 Nh	114 Fl	115 Mc	116 Lv	117 Ts	118 Og


金と銀は同族




相対論的効果がなければ金の色は銀みたいだった!




可視光





光の
吸収なし

相対論 非相対論 非相対論




銀




銀

47番元素



金



青色の光
が吸収



金

79番元素


超重元素の化学

Group → 1 ↓ Period	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	1 H															2 He			
2	3 Li	4 Be										5 B	6 C	7 N	8 O	9 F	10 Ne		
3	11 Na	12 Mg										13 Al	14 Si	15 P	16 S	17 Cl	18 Ar		
4	19 K	20 Ca	21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn	31 Ga	32 Ge	33 As	34 Se	35 Br	36 Kr	
5	37 Rb	38 Sr	39 Y	40 Zr	41 Nb	42 Mo	43 Tc	44 Ru	45 Rh	46 Pd	47 Ag	48 Cd	49 In	50 Sn	51 Sb	52 Te	53 I	54 Xe	
6	55 Cs	56 Ba	57 La	*	72 Hf	73 Ta	74 W	75 Re	76 Os	77 Ir	78 Pt	79 Au	80 Hg	81 Tl	82 Pb	83 Bi	84 Po	85 At	86 Rn
7	87 Fr	88 Ra	89 Ac	*	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Ra	112 Cn	113 Nh	114 Fl	115 Mc	116 Lv	117 Ts	118 Oa
	*	58 Ce	59 Pr	60 Nd	61 Pm	62 Sm	63 Eu	64 Gd	65 Tb	66 Dy	67 Ho	68 Er	69 Tm	70 Yb	71 Lu				
	*	90 Th	91 Pa	92 U	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr				

相対論的效果で超重元素の場所が
どのように変わるものか? → 未解決の謎

相対論的效果で有名な例: 金の色

1	1 H		
2	3 Li	4 Be	
3	11 Na	12 Mg	
4	19 K	20 Ca	21 Sc
5	37 Rb	38 Sr	39 Y
6	55 Cs	56 Ba	57 La
7	87 Fr	88 Ra	89 Ac



7	28 Ni	29 Cu
5	46 Pd	47 Ag
7	78 Pt	79 Au
9	110 Ds	111 Rg

2 He
5 B
6 C
7 N
8 O
9 F
10 Ne
13 Al
14 Si
15 P
16 S
17 Cl
18 Ar





相対論的效果がなければ金の色は銀みたいたった!

ニホニウムで指輪を作ると何色なの?

Wine & Cheese セミナー

超重元素の物理

～原子核周期表と量子開放系～



2020年11月27日 16:30より

Zoom開催 ミーティングID: 818 7896 7023

(パスコードはアナウンスメールをご覧下さい)

講演者：萩野浩一 教授（物2）

レポート問題8(〆切:12月5日(土))

113番元素 Nh を $^{48}\text{Ca} + ^{243}\text{Am} \rightarrow ^{291}\text{Nh}^*$ 反応(熱い核融合反応)と
 $^{70}\text{Zn} + ^{209}\text{Bi} \rightarrow ^{279}\text{Nh}^*$ 反応(冷たい核融合反応)で作る場合で、でき
た原子核の励起エネルギーを比較せよ。ただし、反応の入射エネル
ギーは重心系でクーロン障壁の高さと同じとせよ。
また、それぞれの原子核が平均で何個の中性子を放出するか見積
もれ(中性子の平均的な分離エネルギーを 8 MeV とする)。

必要な情報:

✓ 束縛エネルギー (MeV)

^{48}Ca : 416.0

^{70}Zn : 611.1

^{243}Am : 1829.84

^{209}Bi : 1640.23

^{291}Nh : 2086.85

^{279}Nh : 2004.25

* $^{291,279}\text{Nh}$ の束縛エネルギーは理論値

✓ クーロン障壁の高さ (MeV)

$^{48}\text{Ca} + ^{243}\text{Am}$: 192.7, $^{70}\text{Zn} + ^{209}\text{Bi}$: 256.1

* グローバルポテンシャルによる理論値