はじめに：核子多体問題について

原子核 = 陽子と中性子の多体系

多体のハミルトニアン

$$H = \sum_i T_i + \underbrace{\sum_{i < j} v_{ij}}_{\text{2体力}} + \underbrace{\sum_{i < j < k} v_{ijk}}_{\text{3体力}}$$

このハミルトニアンを核子間のパウリ原理を考慮してどのように(近似的に)解くのか？

N. Ishii, S. Aoki, and T. Hatsuda,
PRL99, 022001 (2007)

強いスピン・アイソスピン依存性:

$$V_C(r) = V_0(r) + V_\sigma(r)\sigma_1 \cdot \sigma_2 + V_\tau(r)\tau_1 \cdot \tau_2 \\ + V_{\sigma\tau}(r)(\sigma_1 \cdot \sigma_2)(\tau_1 \cdot \tau_2)$$

+テンソル力、スピン軌道力、など

テンソル力

$$S_{12} = \frac{3(\boldsymbol{\sigma}_1 \cdot \boldsymbol{r})(\boldsymbol{\sigma}_2 \cdot \boldsymbol{r})}{r^2} - (\boldsymbol{\sigma}_1 \cdot \boldsymbol{\sigma}_2)$$

$$\boldsymbol{S} = \boldsymbol{s}_1 + \boldsymbol{s}_2 = \frac{\hbar}{2}\boldsymbol{\sigma}_1 + \frac{\hbar}{2}\boldsymbol{\sigma}_2 \quad \text{を用いると}$$

$$S_{12} = \frac{2}{\hbar^2} \left[\frac{3(\boldsymbol{S} \cdot \boldsymbol{r})^2}{r^2} - (\boldsymbol{S})^2 \right] \quad \text{と書き直すことができる。}$$

→ $S=0$ ではゼロになる

古典的には:

$$S_{12} = -1$$

$$S_{12} = 2$$

$$S_{12} = 3\cos^2\theta - 1 \sim Y_{20}(\theta)$$

古典的には:

$$S_{12} = -1$$

$$S_{12} = 2$$

$$S_{12} = 3\cos^2\theta - 1 \sim Y_{20}(\theta)$$

量子的には:

$$S_{12} = \frac{3(\boldsymbol{\sigma}_1 \cdot \boldsymbol{r})(\boldsymbol{\sigma}_2 \cdot \boldsymbol{r})}{r^2} - (\boldsymbol{\sigma}_1 \cdot \boldsymbol{\sigma}_2)$$

$$= 3[[\hat{\boldsymbol{r}}\hat{\boldsymbol{r}}]^{(2)}[\boldsymbol{\sigma}_1\boldsymbol{\sigma}_2]^{(2)}]^{(00)}$$

$$[\hat{\boldsymbol{r}}\hat{\boldsymbol{r}}]^{(2M)} = \sum_{m,m'} \langle 1m1m'|2M \rangle \hat{\boldsymbol{r}}_m \hat{\boldsymbol{r}}_{m'} \quad \text{など}$$

テンソルについて

座標系の回転に対し、

$$T_{\lambda\mu} \rightarrow \sum_{\mu'} T_{\lambda\mu'} D_{\mu'\mu}^{\lambda}(\Omega)$$

と変換するもの(球面調和関数 $Y_{\lambda\mu}$ と同じ変換)。

ベクトル (a_x, a_y, a_z) はランク1($\lambda=1$)のテンソル:

$$\begin{aligned} a_{\pm 1} &= \mp \frac{1}{\sqrt{2}}(a_x \pm ia_y) \\ a_0 &= a_z \end{aligned}$$

cf.

$$\begin{aligned} rY_{1\pm 1} &\propto \mp \frac{1}{\sqrt{2}}(x \pm iy) \\ rY_{10} &\propto z \end{aligned}$$

テンソルの合成

$$V_{LM} = [T_{\lambda_1} \times U_{\lambda_2}]^{(LM)} = \sum_{\mu_1, \mu_2} \langle \lambda_1 \mu_1 \lambda_2 \mu_2 | LM \rangle T_{\lambda_1 \mu_1} U_{\lambda_2 \mu_2}$$

$$T_{\lambda_1 \mu_1} U_{\lambda_2 \mu_2} = \sum_{L, M} \langle \lambda_1 \mu_1 \lambda_2 \mu_2 | LM \rangle V_{LM}$$

テンソルのスカラー積

$$T_{\lambda} \cdot U_{\lambda} = \sum_{\mu} (-1)^{\mu} T_{\lambda \mu} U_{\lambda, -\mu}$$

$$\begin{aligned} a_{\pm 1} &= \mp \frac{1}{\sqrt{2}} (a_x \pm i a_y) && \longrightarrow && -a_1 b_{-1} - a_{-1} b_1 + a_0 b_0 \\ a_0 &= a_z && && = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z \end{aligned}$$

(note)

$$\begin{aligned} [T_{\lambda} \times U_{\lambda}]^{(00)} &= \sum_{\mu_1, \mu_2} \langle \lambda \mu_1 \lambda \mu_2 | 00 \rangle T_{\lambda \mu_1} U_{\lambda \mu_2} = \sum_{\mu} \frac{(-1)^{\lambda - \mu}}{\sqrt{2\lambda + 1}} T_{\lambda \mu} U_{\lambda, -\mu} \\ &= \frac{(-1)^{\lambda}}{\sqrt{2\lambda + 1}} T_{\lambda} \cdot U_{\lambda} \end{aligned}$$

$$S_{12} = \frac{3(\boldsymbol{\sigma}_1 \cdot \boldsymbol{r})(\boldsymbol{\sigma}_2 \cdot \boldsymbol{r})}{r^2} - (\boldsymbol{\sigma}_1 \cdot \boldsymbol{\sigma}_2)$$

$$= 3[[\hat{\boldsymbol{r}}\hat{\boldsymbol{r}}]^{(2)}[\boldsymbol{\sigma}_1\boldsymbol{\sigma}_2]^{(2)}]^{(00)}$$

$$[\hat{\boldsymbol{r}}\hat{\boldsymbol{r}}]^{(2M)} = \sum_{m,m'} \langle 1m1m'|2M \rangle \hat{\boldsymbol{r}}_m \hat{\boldsymbol{r}}_{m'} \quad \text{など}$$

テンソル力

$$S_{12} = \frac{3(\boldsymbol{\sigma}_1 \cdot \boldsymbol{r})(\boldsymbol{\sigma}_2 \cdot \boldsymbol{r})}{r^2} - (\boldsymbol{\sigma}_1 \cdot \boldsymbol{\sigma}_2)$$

→ $S=0$ ではゼロになる

- ・重陽子 ($S=1$) が束縛し、 nn ($S=0$) が束縛しない理由
- ・重陽子のD波成分(四重極モーメント)の説明(4%程度のD波成分)

はじめに：原子核の基本的な性質

$$H = \sum_i T_i + \underbrace{\sum_{i < j} v_{ij}}_{\text{2体力}} + \underbrace{\sum_{i < j < k} v_{ijk}}_{\text{3体力}}$$

原子核 = 陽子と中性子の多体系

- 基底状態のエネルギー(原子核の質量)？
- 多体系の大きさ(半径)？
- 基底状態の形(変形？)
- 励起スペクトル？
- 原子核と原子核を衝突させると何が起きる？

原子核の質量

1. $B(N,Z)/A \sim 8.5$ MeV ($A > 12$)

(ほぼ一定)

1. $B(N,Z)/A \sim 8.5 \text{ MeV} (A > 12) \iff$ 短距離力 (核子間相互作用)
 (ほぼ一定)

もし、それぞれの核子が近くの α 個の粒子とだけ相互作用するとしたら:

$$B \sim \alpha A/2 \longrightarrow B/A \sim \alpha/2 \text{ (const.)}$$

$$\alpha = \frac{4\pi}{3} r_{\text{int}}^3 \cdot \rho$$

1. $B(N,Z)/A \sim 8.5 \text{ MeV} (A > 12) \iff$ 短距離力(核子間相互作用)

2. 重い原子核に対してはクーロン力の影響

← B/A が A に比例して減少
(長距離力(クーロン力)がはたらいっている証拠)

1. $B(N,Z)/A \sim 8.5 \text{ MeV} (A > 12) \iff$ 短距離力(核子間相互作用)
2. 重い原子核に対してはクーロン力の影響
 - ← B/A が A に比例して減少
(長距離力(クーロン力)がはたらいっている証拠)

もし、それぞれの核子が近くの α 個の粒子とだけ相互作用するとしたら:

$$B \sim \alpha A/2 \longrightarrow B/A \sim \alpha/2 \text{ (const.)}$$

もし、それぞれの核子が近くの α 個の粒子とだけ相互作用するとしたら:

$$B \sim \alpha A/2 \longrightarrow B/A \sim \alpha/2 \text{ (const.)}$$

小さな原子核だと

$$\alpha = \frac{4\pi}{3} r_{\text{int}}^3 \cdot \rho$$

もし、それぞれの核子が近くの α 個の粒子とだけ相互作用するとしたら:

$$B \sim \alpha A/2 \longrightarrow B/A \sim \alpha/2 \text{ (const.)}$$

$$\alpha = \frac{4\pi}{3} r_{\text{int}}^3 \cdot \rho$$

小さな原子核だと

$$\rightarrow B/A \propto A - 1$$

もし、それぞれの核子が近くの α 個の粒子とだけ相互作用するとしたら:

$$B \sim \alpha A/2 \longrightarrow B/A \sim \alpha/2 \text{ (const.)}$$

$$\alpha = \frac{4\pi}{3} r_{\text{int}}^3 \cdot \rho$$

小さな原子核だと

$$\rightarrow B/A \propto A - 1$$

核力

クーロン力

B/A

$\rightarrow B/A \propto A - 1$

$\alpha+1$

A

核力

クーロン力

B/A

$\rightarrow B/A \propto A - 1$

クーロンによる補正

ピーク

A

核力のレンジの見積もり

$$\alpha = \frac{4\pi}{3} r_{\text{int}}^3 \cdot \rho$$

小さな原子核だと

$$\rightarrow B/A \propto A - 1$$

この図から α の値を読み取ると、
 $\alpha \sim 10$ くらい。

核力の到達距離は、
 $1.1 \times 10^{1/3} = 2.37 \text{ fm}$ 程度。

湯川相互作用:

$$v(r) = -g \frac{e^{-\kappa r}}{r}$$

$$\frac{1}{\kappa} = \frac{\hbar}{m_{\pi} c} = 1.41 \text{ fm}$$

1. $B(A, Z)/A \approx 0.8 \text{ MeV}$ ($A > 12$) $\iff$ Short range
2. Effect of Coulomb force for heavy nuclei
3. Fusion for light nuclei
4. Fission for heavy nuclei

Semi-empirical mass formula

(Bethe-Weizacker formula: Liquid-drop model)

$$B(N, Z) = a_v A - a_s A^{2/3} - a_C \frac{Z^2}{A^{1/3}} - a_{\text{sym}} \frac{(N - Z)^2}{A}$$

- Volume energy: $a_v A$
- Surface energy: $-a_s A^{2/3}$
- Coulomb energy: $-a_C Z^2 / A^{1/3}$
- Symmetry energy: $-a_{\text{sym}} (N - Z)^2 / A$

どのくらい実験を再現するか？

✓ 大体OK、だけど所々にずれ

✓ $N, Z = 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126$ (魔法数)に対して束縛エネルギー大

→ 「殻構造」

$N = 50$