3250

現代物理学

京都大学で行なわれている最前線の物理学・宇宙物理学の研究について、専門の教員が交替で3回生向けにわかりやすく紹介する。実験や理論のさまざまな研究現場の熱気的一端に触れると同時に、物理学の展望を得て将来の研究分野選択の参考になればという趣旨のリレー講義である(全10回)。

令和2年度後期 専門科目(1単位)

日時：火曜 14:45—16:55

第3回：10月20日(火) 14:45-16:55

フェムトの世界

「原子核の周期表：フェムトの世界における殻現象」

萩野浩一(60分)

「クォークが生み出す高密度の世界」

永江知文(60分)

質問は随時してもらってもOKです。
(最後に質問の時間も設けます)

本日の講義で、印象に残った内容を具体的かつ簡潔に記述せよ（感想を含んでもよい）

また、疑問に思ったことや、自分で調べる／考える／試す などしてみたいと思ったことがあればそれも書くこと

（作成時間 10分程度）

- **提出締切** : **明日 午前9時**
- **提出方法** : **PandA の「課題」ページより**

第3回：10月20日(火) 14:45-16:55

フェムトの世界

「原子核の周期表：フェムトの世界における殻現象」

「クォークが生み出す高密度の世界」

萩野浩一(60分)

永江知文(60分)

フェムト = 10^{-15}

原子核の大きさ ~ 数 fm (10^{-15} m)

「フェムト」の世界

第3回：10月20日(火) 14:45-16:55

フェムトの世界

「原子核の周期表：フェムトの世界における殻現象」

「クォークが生み出す高密度の世界」

萩野浩一(60分)

永江知文(60分)

原子核

陽子と中性子の多体系

簡単に変形したりする

- ✓ 振動
- ✓ 静的な変形
- ✓ 核分裂

第3回：10月20日(火) 14:45-16:55

フェムトの世界

「原子核の周期表：フェムトの世界における殻現象」

「クォークが生み出す高密度の世界」

萩野浩一(60分)

永江知文(60分)

原子核の周期表： フェムトの世界における殻現象

萩野浩一

物理学第二教室

原子核理論研究室

原子核周期表「ニュークリタッチ」

$$5g_{9/2}: n_p = n + \ell = 5, n = 1, \ell = 4, j = \ell + s = 9/2$$

Shape and stability

	Stable	Unstable
Spherical	Nb 41	Nh 113
Deformed	Mo 42	Tc 43

$$20 \frac{IV}{17} 20.$$

Sb	Te	I	Xe	Cs	Ba	La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61							68
Bi	Po	At	Rn	Fr	Ra	Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm
83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

共同研究者

前野さん(物1)

原子核の周期表： フェムトの世界における殻現象

萩野浩一

物理学第二教室

原子核理論研究室

1. 元素の周期表と原子のボーア模型
2. 原子核にも殻構造がある！
3. 原子核の殻構造の重要性
4. 原子核で周期表を作ってみると？
～マジックな偶然～

元素の周期表(1869年にメンデレーエフが発表)

International Year
of the Periodic Table
of Chemical Elements

国際周期表年(2019年)

メンデレーエフ
(1834-1907)

元素の周期表（1869年にメンデレーエフが発表）

International Year
of the Periodic Table
of Chemical Elements

国際周期表年（2019年）

閉会式（令和元年12月5日：
東京）

メンデレーエフによる周期表のオリジナル

Ann. Suppl. 8, 133 (1871).

Reihen	Gruppe 1 — R ₂ O	Gruppe 2 — RO	Gruppe 3 — R ₂ O ₃	Gruppe 4 RH ₄ RO ₂	Gruppe 5 RH ₃ R ₂ O ₅	Gruppe 6 RH ₂ RO ₃	Gruppe 7 RH R ₂ O ₇	Gruppe 8 — RO ₄
1	H=1							
2	Li=7	Be=9.4	B=11	C=12	N=14	O=16	F=19	
3	Na=23	Mg=24	Al=27.3	Si=28	P=31	S=32	Cl=35.5	
4	K=39	Ca=40	--=44	Ti=48	V=51	Cr=52	Mn=55	Fe=56 Co=59 Ni=59 Cu=63
5	(Cu=63)	Zn=65	--=68	--=72	As=75	Se=78	Br=80	
6	Rb=85	Sr=87	?Yt=88	Zr=90	Nb=94	Mo=96	--=100	Ru=104 Rh=104 Pd=106 Ag=108
7	(Ag=108)	Cd=112	In=113	Sn=118	Sb=122	Te=125	J=127	
8	Cs=133	Ba=137	?Di=138	?Ce=140	—	—	—	— — — —
9	(—)	—	—	—	—	—	—	
10	—	—	?Er=178	?La=180	Ta=182	W=184	—	Os=195 Ir=197 Pt=198 Au=199
11	(Au=199)	Hg=200	Tl=204	Pb=207	Bi=208	—	—	
12	—	—	—	Th=231	—	U=240	—	— — — —

メンデレーエフによる周期表のオリジナル

Ann. Suppl. 8, 133 (1871).

Reihen	Gruppe 1 — R ₂ O	Gruppe 2 — RO	Gruppe 3 — R ₂ O ₃	Gruppe 4 RH ₄ RO ₂	Gruppe 5 RH ₃ R ₂ O ₅	Gruppe 6 RH ₂ RO ₃	Gruppe 7 RH R ₂ O ₇	Gruppe 8 — RO ₄
1	H=1							
2	Li=7	Be=9.4	B=11	C=12	N=14	O=16	F=19	
3	Na=23	Mg=24	Al=27.3	Si=28	P=31	S=32	Cl=35.5	
4	K=39	Ca=40	--44	Ti=48	V=51	Cr=52	Mn=55	Fe=56 Co=59 Ni=59 Cu=63
5	(Cu=63)	Zn=65	--68	--72	As=75	Se=78	Br=80	
6	Rb=85	Sr=87	?Yt=88	Zr=90	Nb=94	Mo=96	--100	Ru=104 Rh=104 Pd=106 Ag=108
7	(Ag=108)	Cd=112	In=113	Sn=118	Sb=122	Te=125	J=127	
8	Cs=133	Ba=137	?Di=138	?Ce=140	—	—	—	— — — —
9	(—)	—	—	—	—	—	—	
10	—	—	?Er=178	?La=180	Ta=182	W=184	—	Os=195 Ir=197 Pt=198 Au=199
11	(Au=199)	Hg=200	Tl=204	Pb=207	Bi=208	—	—	
12	—	—	—	Th=231	—	U=240	—	— — — —

ガリウムの発見
(1874年)

ゲルマニウムの発見
(1879年)

フェルミオン多体系とパウリ原理

原子 = 電子 (フェルミ粒子) の多体系

パウリ原理: 2つの同種フェルミオンは同じ状態をとれない

殻構造と魔法数

1次元引カポテンシャル

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + V(x) \right) \psi(x) = E\psi(x)$$

殻構造と魔法数

1次元引力ポテンシャル

離散的な束縛状態

多フェルミオン系の基底状態

= パウリ原理を考慮して粒子を下の状態から詰める

殻構造と魔法数

水素様原子:

$$V(r) = -\frac{Ze^2}{r}$$

$$E_n = -\frac{(Z\alpha)^2}{2n^2} mc^2$$

$$\alpha = \frac{e^2}{\hbar c} \sim \frac{1}{137}$$

$$n = n_r + l + 1$$

殻構造と魔法数

水素様原子:

$$V(r) = -\frac{Ze^2}{r}$$

$$E_n = -\frac{(Z\alpha)^2}{2n^2} mc^2$$

$$\alpha = \frac{e^2}{\hbar c} \sim \frac{1}{137}$$

$$n = n_r + l + 1$$

殻構造と魔法数

水素様原子:

$$V(r) = -\frac{Ze^2}{r}$$

縮退度 = $2 \times (2l+1)$

(スピン $\times l_z$)

3S [2]

3P [6]

3D [10]

2S [2]

2P [6]

1S [2]

$$E_n = -\frac{(Z\alpha)^2}{2n^2} mc^2$$

$$\alpha = \frac{e^2}{\hbar c} \sim \frac{1}{137}$$

$$n = n_r + l + 1$$

殻構造と魔法数

水素様原子:

$$V(r) = -\frac{Ze^2}{r}$$

$$\text{縮退度} = 2 \times (2l+1)$$

(スピン $\times l_z$)

3S [2]	3P [6]	3D [10]
2S [2]	2P [6]	

$$E_n = -\frac{(Z\alpha)^2}{2n^2} mc^2$$

$$\alpha = \frac{e^2}{\hbar c} \sim \frac{1}{137}$$

$$n = n_r + l + 1$$

殻構造と魔法数

水素様原子:

$$V(r) = -\frac{Ze^2}{r}$$

$$\text{縮退度} = 2 \times (2l+1)$$

$$(\text{スピン} \times l_z)$$

$$E_n = -\frac{(Z\alpha)^2}{2n^2} mc^2$$

$$\alpha = \frac{e^2}{\hbar c} \sim \frac{1}{137}$$

$$n = n_r + l + 1$$

殻構造と魔法数

水素様原子:

$$V(r) = -\frac{Ze^2}{r}$$

$$\text{縮退度} = 2 \times (2l + 1)$$

内殻電子による遮蔽効果

$$E_n = -\frac{(Z\alpha)^2}{2n^2} mc^2$$

$$\alpha = \frac{e^2}{\hbar c} \sim \frac{1}{137}$$

$$n = n_r + l + 1$$

殻構造と魔法数

水素様原子:

$$V(r) = -\frac{Ze^2}{r}$$

縮退度 = $2 \times (2l + 1)$

内殻電子による遮蔽効果

$$E_n = -\frac{(Z\alpha)^2}{2n^2} mc^2$$

$$\alpha = \frac{e^2}{\hbar c} \sim \frac{1}{137}$$

$$n = n_r + l + 1$$

殻構造と魔法数

水素様原子:

$$V(r) = -\frac{Ze^2}{r}$$

$$\text{縮退度} = 2 \times (2l + 1)$$

内殻電子による遮蔽効果

“殻が閉じる(閉殻)”
(魔法数)

化学的に安定
→希ガス

元素の周期表

希ガス

Group →	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
↓ Period																		
1	1 H																	2 He
2	3 Li	4 Be											5 B	6 C	7 N	8 O	9 F	10 Ne
3	11 Na	12 Mg											13 Al	14 Si	15 P	16 S	17 Cl	18 Ar
4	19 K	20 Ca	21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn	31 Ga	32 Ge	33 As	34 Se	35 Br	36 Kr
5	37 Rb	38 Sr	39 Y	40 Zr	41 Nb	42 Mo	43 Tc	44 Ru	45 Rh	46 Pd	47 Ag	48 Cd	49 In	50 Sn	51 Sb	52 Te	53 I	54 Xe
6	55 Cs	56 Ba	57 La *	72 Hf	73 Ta	74 W	75 Re	76 Os	77 Ir	78 Pt	79 Au	80 Hg	81 Tl	82 Pb	83 Bi	84 Po	85 At	86 Rn
7	87 Fr	88 Ra	89 Ac *	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113 Nh	114 Fl	115 Mc	116 Lv	117 Ts	118 Og
				* 58 Ce	59 Pr	60 Nd	61 Pm	62 Sm	63 Eu	64 Gd	65 Tb	66 Dy	67 Ho	68 Er	69 Tm	70 Yb	71 Lu	
				* 90 Th	91 Pa	92 U	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr	

元素の周期表

希ガス

原子核の殻構造

実は、同じような軌道が陽子や中性子にも考えられる

原子の構造
(Neの場合)

原子核の構造
(^{16}O の場合)

原子核の殻構造

原子核をつくる中性子や陽子同士にはたらく力(強い相互作用)によって軌道ができる。

Nobel Foundation archive

湯川秀樹

強い相互作用の研究で
ノーベル物理学賞(1949年)

核子間相互作用を
平均的に取り扱う
→平均場ポテンシャル

$$V(\mathbf{r}) \sim \int v(\mathbf{r} - \mathbf{r}') \rho(\mathbf{r}') d\mathbf{r}'$$

原子核の殻構造

3次元調和振動子

$$V(r) = \frac{1}{2}m\omega^2 r^2$$

原子核の殻構造

スピン軌道力

$$\xi \mathbf{l} \cdot \mathbf{s}$$

原子核の殻構造

スピン軌道力

希ガスのときのように軌道が埋まると原子核が安定になる。

魔法数: 2, 8, 20, 28, 50, 82, (126)

* 希ガスは2, 10, 18, 36, 54, 86, 118

殻模型(からもけい)

メイヤー

イエンセン

Nobel Foundation archive

1963年にノーベル物理学賞を受賞(メイヤーは2人目の女性受賞者)

中性子分離エネルギー(原子のイオン化エネルギーに相当)

中性子分離エネルギー(原子のイオン化エネルギーに相当)

図: 武藤一雄氏講義ノートより

Pbアイソトープの第一励起状態の励起エネルギー

原子核の殻構造の重要性

Yuri Oganessian

原子核の安定領域の理論的予言

原子核の殻構造の重要性

新しい核反応モデルの開発

時間に依存する
密度汎関数理論

1st stage: TDHF

3rd stage:
statistical model

統計力学的手法

2nd stage:
Langevin model

ランジュバン方程式

113 Nh nihonium	115 Mc moscovium
117 Ts tennessine	118 Og oganeson

安定の島
(超重元素)

安定の海

生命誕生のための幸運な偶然: 元素合成

原子の魔法数

電子の数が 2, 10, 18, 36, 54, 86

原子核の魔法数

陽子または中性子の数が
2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 の時安定

元素の周期表

1A	2A	3A	4A	5A	6A	7A	8	1B	2B	3B	4B	5B	6B	7B	8		
1 H															2 He		
3 Li	4 Be														10 Ne		
11 Na	12 Mg														18 Ar		
19 K	20 Ca	21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn	31 Ga	32 Ge	33 As	34 Se	35 Br	36 Kr
37 Rb	38 Sr	39 Y	40 Zr	41 Nb	42 Mo	43 Tc	44 Ru	45 Rh	46 Pd	47 Ag	48 Cd	49 In	50 Sn	51 Sb	52 Te	53 I	54 Xe
55 Cs	56 Ba	57 L	72 Hf	73 Ta	74 W	75 Re	76 Os	77 Ir	78 Pt	79 Au	80 Hg	81 Tl	82 Pb	83 Bi	84 Po	85 At	86 Rn
67 Fr	68 Ra	69 A															
		57 L	58 La	59 Ce	60 Pr	61 Nd	62 Pm	63 Sm	64 Eu	65 Gd	66 Tb	67 Dy	68 Ho	69 Er	70 Tm	71 Yb	Lu
		69 A	89 Ac	90 Th	91 Pa	92 U	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr

二重閉殻

● 典型金属元素
● 半金属元素
● 非金属元素
● 遷移金属元素
● 希ガス

→ 例えば $^{16}_8\text{O}_8$ (二重閉殻)

→ 酸素元素は元素合成の過程で数多く生成

→ しかし、酸素は化学的には「活性」

→ 化学反応により様々な複雑な物質をつくり生命に至った

不活性ガス: He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn

もし原子と原子核で魔法数が同じだったら人類は生まれていなかった(かもしれない)

重い元素の生成プロセス: r-プロセス元素合成

中性子星の合体

中性子が陽子に変わり元素番号
が1増える

変化する魔法数

原子核の周期表

原子核にも殻構造があるのであれば、原子核でも周期表を作れないかな？
原子核の魔法数は希ガスに対応するし。

原子核の周期表

ありそうでなかった

元素周期表に中性子の情報を加えた原子核の2次元マップ

原子核の周期表

ありそうでなかった

じゃあ、ちょっと考えて
みましょう。

元素周期表に中性子の情報を加えた原子核の2次元マップ

原子核の周期表

2次元の核図表を1次元にマップする

- ✓ 元素の周期表と対応づけるため陽子を基準にする
- ✓ 中性子をどうするか？

→ それぞれの元素から代表的な原子核を選ぶ(黒印の原子核)

- 最も存在比の大きいもの
- 最も寿命が長いもの(安定同位体がない場合)

原子核の周期表

陽子の魔法数

原子核の周期表

陽子の魔法数

	Stable	Unstable
Spherical	Nb 41	Nh 113
Deformed	Mo 42	Tc 43

- ✓ 変形している原子核は丸い四角
- ✓ 不安定な原子核は白抜き

$$20 \frac{IV}{17} 20.$$

Sb	Te	I	Xe	Cs	Ba	La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61							68
Bi	Po	At	Rn	Fr	Ra	Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm
83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

原子核の変形

$$H = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega_z^2 z^2 + \frac{1}{2}m\omega_{\perp}^2 (x^2 + y^2)$$

$$\omega_z = \omega_0 \left(1 - \frac{2}{3}\epsilon\right) \quad \omega_{\perp} = \omega_0 \left(1 + \frac{\epsilon}{3}\right)$$

0.903 ————— 8⁺
(MeV)

0.544 ————— 6⁺

0.267 ————— 4⁺

0.082 ————— 2⁺
0 ————— 0⁺

¹⁵⁴Sm

$$E_I \sim \frac{I(I+1)\hbar^2}{2\mathcal{J}}$$

回転スペクトル

変形すると魔法数が変わる

→ 粒子数によっては変形した方がエネルギー的に安定

A nuclear periodic table

K. Hagino¹ · Y. Maeno¹

© The Author(s) 2020

Abstract

There has been plenty of empirical evidence which shows that the single-particle picture holds to a good approximation in atomic nuclei. In this picture, protons and neutrons move independently inside a mean-field potential generated by an interaction among the nucleons. This leads to the concept of nuclear shells, similar to the electronic shells in atoms. In particular, the magic numbers due to closures of the nucleonic shells, corresponding to noble gases in elements, have been known to play an important role in nuclear physics. Here we propose a periodic table for atomic nuclei, in which the elements are arranged according to the known nucleonic shells. The nuclear periodic table clearly indicates that nuclei in the vicinity of the magic numbers can be understood in terms of a shell closure with one or two additional nucleons or nucleon holes, while nuclei far from the magic numbers are characterized by nuclear deformation.

Keywords Atomic nuclei · Magic numbers · Shell closure · Nuclear deformation · Periodic table

Introduction

Atomic nuclei are located at the center of atoms and carry almost all the fraction of the mass of atoms. They consist of a small number of protons and neutrons, collectively called

- オープンアクセス
(誰でもDL可能)
- 7ページ
- 式は1つだけ

3回生でも十分読めます

URL

<https://rdcu.be/b3F3W>

固体量子(こたいりょうこ)さんによる解説

<https://www.youtube.com/watch?v=J9nms2Ygs8k>

京都大学 KYOTO UNIVERSITY

報道発表・Press Release

総務部 広報課 国際広報室
075.753.5727
comro@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

2020年4月22日 (火)

新しい周期表を考案 —原子核の周期表 「ニュークリタッチ」—

京都大学 大学院理学研究科

物理学第一専攻 教授 物理学第二専攻 教授

まえのよしてる 前野悦輝 (低温物理学、超伝導)

はぎのこういち 萩野浩一 (原子核理論)

1,659 回視聴・2020/04/24

112 0 共有 保存 ...

固体量子-こたいりょうこ-
チャンネル登録者数 1.18万人

みんな！ニュークリタッチつくってみよう

チャンネル登録

固体量子物性研究室非公式チャンネル (Youtube)

いろいろなメディアに取り上げてもらいました

購読はこちら [1週間無料]

読賣新聞

オンライン

ログイン 新規登録

ニュース > 科学・IT

「すいへーりーべ」でおなじみの元素周期表、新パターン提案…京大が原子核の状態着目

2020/04/22 23:41

日本経済新聞

ストーリー Myニュース 日

トップ 速報 マネー 経済・金融 政治 ビジネス マーケット テクノロジー

新しい周期表を考案 京大、原子核の性質を表現

2020/5/3付 | 日本経済新聞 朝刊

保存 共有

京都大学の前野悦輝教授と萩野浩一教授は、原子核の性質をわかりやすく新しい周期表を考案した。従来の周期表が元素の化学的な性質を知るのに役立つ。新しい周期表は元素の原子核の性質を知るのに使える。

NEWS RELEASE 27-MAY-2020

A special elemental magic

Kyoto scientists announce a 'nuclear' periodic table

KYOTO UNIVERSITY

Японские физики представили новую периодическую таблицу элементов

19:34 27.05.2020 58122

© Фото : Kyoto University/Yoshiteru Maeno/Kouichi Hagino

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Ученые из [Киотского университета](#) представили периодическую таблицу элементов, которая в отличие от таблицы Менделеева, где за основу взяты электроны в атоме, основана на

さいごに

前野さん
(物性実験)

萩野
(原子核理論)

2019年12月の物1、物2合同忘年会で隣同士の席
→周期表話で盛り上がる

- 前野さん: 原子核分野の人の意見が欲しかった
- 萩野: 核周期表のような発想は全くなかった
→核周期表を作って初めて「偶然の一致」を発見

いい共同研究の形

飲み会をはじめとして雑談をすることの重要性
(コロナが終わったらぜひ)