青木さんとの流れ

場の量子論における非摂動論的手法と素粒子物理学への応用

青木慎也教授 還暦記念研究会

2019年12月20日 @ 基礎物理学研究所

横山 修一

所属：基礎物理学研究所(基研)

流れとは？

Q: 最初の出会い？

➔ 2016年4月@基研 (横山着任)

東大本郷素粒子論研究室の先輩 -> 江口研の第一期生!

Q: 初めての会話？

今日セミナーはあるんですか？

2016年4月@Y306前(セミナー室)

Q: 共同研究の始まり？

➔ ランチ後の雑談 (+ 2回のセミナー)

一般のCFT(共形場理論)で**方程式の方法を拡張できるんじゃないか？

2017年4月@研究棟ロビー

変わったことをやらないといけない!

共同研究

➡ **流れ(フロー)**方程式を用いたホログラフィーの研究

ゲージ/重力対応、量子重力、...

- [1] Non-relativistic Hybrid Geometry with Gravitational Gauge-Fixing Term
Sinya Aoki, Janos Balog, Shuichi Yokoyama, Kentaroh Yoshida
arXiv:1910.11032
- [2] Holographic geometry for non-relativistic systems emerging from generalized flow equations
Sinya Aoki, Shuichi Yokoyama, Kentaroh Yoshida
Phys.Rev. D99 (2019) no.12, 126002, arXiv:1902.02578
- [3] Holographic computation of quantum corrections to the bulk cosmological constant
Sinya Aoki, Janos Balog, Shuichi Yokoyama
PTEP 2019 (2019) no.4, 043B06, arXiv:1804.04636
- [4] AdS geometry from CFT on a general conformally flat manifold
Sinya Aoki, Shuichi Yokoyama
Nucl.Phys. B933 (2018) 262-274, arXiv:1709.07281
- [5] Flow equation, conformal symmetry and AdS geometry
Sinya Aoki, Shuichi Yokoyama
PTEP 2018 (2018) no.3, 031B01, arXiv:1707.03982

親父ギャグ...

フロー方程式とは何か？

フロー方程式とは何か？

筋はいいので勉強してください。

フロー方程式

[Albanese et al. (APE) '87] [Narayanan-Neuberger '06]

d次元CFTを考えプライマリースカラー場 ϕ を含むとする。

2点関数

$$\langle \phi(x_1)\phi(x_2) \rangle = \frac{1}{x_{12}^{2\Delta}} \quad x_{12} := x_1 - x_2$$

自由フロー方程式

$$\frac{\partial \phi(x; \eta)}{\partial \eta} = \partial^2 \phi(x; \eta). \quad \phi(x; 0) = \phi(x)$$

フロー

$$\rightarrow \phi(x; \eta) = \int d^d y K(x - y; \eta) \phi(y). \quad K(x - y; \eta) = \frac{e^{-(x-y)^2/4\eta}}{(4\pi\eta)^{d/2}}$$

2点関数

$$\langle \phi(x_1; \eta_1)\phi(x_2; \eta_2) \rangle = \frac{1}{\eta_+^\Delta} F\left(\frac{x_{12}^2}{\eta_+}; 1\right) \quad \eta_+ := \eta_1 + \eta_2$$

$$F(v; 1) = \frac{1}{(4\pi)^{\frac{d}{2}}} \int_0^1 du (1-u)^{d/2-\Delta-1} e^{-vu/4} u^{\Delta-1} \quad \frac{d-2}{2} \leq \Delta < \frac{d-1}{2}$$

フローされた作用素はぶつかっても発散しない！

フロー変換

湯川秀樹(基研初代所長) -> **非局所場の理論**の研究

$\phi(x)$

Cf. 素粒子

フロー
(非局所変換)

$$\phi(x; \eta) = \int d^d y K(x - y; \eta) \phi(y).$$

ガウス波束

ホログラフィーとは？

ホログラフィーとは

2次元平面

3次元空間

同じ情報をもたせることができる! [Denes Gabor '47]

ホログラフィーとは

2次元平面

3次元空間

同じ情報をもたせることができる! [Denes Gabor '47]

ホログラフィーとは

2次元平面

3次元空間

同じ情報をもたせることができる! [Denes Gabor '47]

ホログラフィーとは

2次元平面

3次元空間

同じ情報をもたせることができる! [Denes Gabor '47]

理論間でも同じ情報をもつ!?' [t Hooft '93, Susskind '94]

理論A@境界

理論B@空間

ホログラフィーとは

4次元平面

5次元空間

同じ情報をもたせることができる! [Denes Gabor '47]

理論間でも同じ情報をもつ!? ['t Hooft '93, Susskind '94]

$R^{1,3}$ 上のN=4SYM理論

“AdS/CFT対応”

AdS₅上のtype IIB理論

[Maldacena '97]

R^d 上のゲージ理論

“ゲージ/重力対応”

AdS_{d+1}上の重力理論

ご利益

- ゲージ理論の強結合現象が重力理論の摂動論で解析できる!
- 量子重力理論をゲージ理論から構成できる!

フロー方程式を用いたホログラフィーの研究

フロー方程式を用いたホログラフィー

[Aoki-Kikuchi-Onogi '15]

[Aoki-Balog-Onogi-Weisz '16,'17]

[Aoki-SY '17]

ホログラフィック空間の構成

[Aoki-Kikuchi-Onogi '15]

Def. (規格化された作用素)

[Aoki-Balog-Onogi-Weisz '16,'17]

$$\sigma(x; \eta) := \frac{\phi(x; \eta)}{\sqrt{\langle \phi(x; \eta)^2 \rangle}}$$

$$\rightarrow \langle \sigma(x; \eta) \sigma(x; \eta) \rangle = 1$$

Def. (計量作用素と誘導計量)

$$\hat{g}_{MN}(x; \eta) := \frac{\partial \sigma(x; \eta)}{\partial z^M} \frac{\partial \sigma(x; \eta)}{\partial z^N}$$

$$g_{MN}(z) := \langle \hat{g}_{MN}(x; \eta) \rangle_{CFT}$$

$$z^M = (x^\mu, \tau) \text{ with } \tau \propto \sqrt{\eta}$$

→ 誘導計量は**情報計量**と解釈できる。

[Aoki-SY '17]

d次元CFTの場合

$$\langle \sigma(x_1; \eta_1) \sigma(x_2; \eta_2) \rangle = \left(\frac{2\sqrt{\eta_1 \eta_2}}{\eta_+} \right)^\Delta G \left(\frac{x_{12}^2}{\eta_+} \right), \quad G(u) := F(u; 1) / F(0; 1)$$

$$\longrightarrow g_{\mu\nu}(z) = \delta_{\mu\nu} \frac{\Delta}{\tau^2}, \quad g_{\tau\tau}(z) = \frac{\Delta}{\tau^2} \quad \tau := \sqrt{-\Delta\eta / G'(0)}$$

$$\longrightarrow ds^2 = \Delta \frac{dx^2 + d\tau^2}{\tau^2}.$$

AdS空間!!

粗視化 $\Rightarrow$ 余剰次元

Cf. Gelfand-Shirov thm

一般のCFT(共形場理論)でフロー
方程式の方法を拡張できるん
じゃないか？

2017年4月@研究棟ロビー

共形対称性があればバルクの計量は
AdSに決まるんじゃないか？

共形対称性とAdS等長変換

[Aoki-SY '17]

共形変換:

$$\delta x^\mu = a^\mu + \omega^\mu{}_\nu x^\nu + \lambda x^\mu + b^\mu x^2 - 2x^\mu (b_\nu x^\nu),$$

$$\delta^{\text{conf}} O(x) = -\delta x^\mu \partial_\mu O(x) - \frac{\Delta}{d} (\partial_\mu \delta x^\mu) O(x)$$

$$\delta^{\text{conf}} \sigma(x; t) = -\{2\lambda - 4(b_\mu x^\mu)\} t \partial_t \sigma(x; t) - \{\delta x^\mu + 2t(d - 2 - \Delta)b^\mu\} \partial_\mu \sigma(x; t) + \boxed{4t^2 b^\mu \partial_\mu \partial_t \sigma(x; t)}$$

高階微分項はバルクの微分同相の無限小変換として解釈できない...

cf. [Das-Jevicki '13] or Das's talk in 'Strings and Fields 2017'

変換を1次微分と高階微分に分解する

$$\delta^{\text{conf}} \sigma(x; t) = \delta^{\text{diff}} \sigma(x; t) + \delta^{\text{extra}} \sigma(x; t),$$

$$\delta^{\text{diff}} \sigma(x; t) = -(\bar{\delta} t \partial_t + \bar{\delta} x^\mu \partial_\mu) \sigma(x; t), \quad \delta^{\text{extra}} \sigma(x; t) = \boxed{4t^2 b^\nu \partial_\nu (\partial_t + \frac{\Delta + 2}{2t})} \sigma(x; t),$$

where $\bar{\delta} x^\mu = \delta x^\mu + 2dtb^\mu, \bar{\delta} t = (2\lambda - 4(b_\mu x^\mu))t$

$$\delta^S \hat{g}_{MN}(x; \eta) = \delta^{\text{diff}} \hat{g}_{MN}(x; \eta) + \boxed{\lim_{(y; \eta') \rightarrow (x; \eta)} \frac{\partial}{\partial z^M} \frac{\partial}{\partial w^N} \{ \delta^{\text{extra}} \sigma(x; \eta) \sigma(y; \eta') + \sigma(x; \eta) \delta^{\text{extra}} \sigma(y; \eta') \}}.$$

真空期待値をとると消える!

$$\boxed{\langle \delta^{\text{conf}} \hat{g}_{MN}(x; t) \rangle = \langle \delta^{\text{diff}} \hat{g}_{MN}(x; t) \rangle.}$$

共同研究

➡ **流れ(フロー)**方程式を用いたホログラフィーの研究

ゲージ/重力対応、量子重力、...

- [1] Non-relativistic Hybrid Geometry with Gravitational Gauge-Fixing Term
Sinya Aoki, Janos Balog, Shuichi Yokoyama, Kentaroh Yoshida
arXiv:1910.11032
- [2] Holographic geometry for non-relativistic systems emerging from generalized flow equations
Sinya Aoki, Shuichi Yokoyama, Kentaroh Yoshida
Phys.Rev. D99 (2019) no.12, 126002, arXiv:1902.02578
- [3] Holographic computation of quantum corrections to the bulk cosmological constant
Sinya Aoki, Janos Balog, Shuichi Yokoyama
PTEP 2019 (2019) no.4, 043B06, arXiv:1804.04636
- [4] AdS geometry from CFT on a general conformally flat manifold
Sinya Aoki, Shuichi Yokoyama
Nucl.Phys. B933 (2018) 262-274, arXiv:1709.07281
- [5] Flow equation, conformal symmetry and AdS geometry
Sinya Aoki, Shuichi Yokoyama
PTEP 2018 (2018) no.3, 031B01, arXiv:1707.03982

境界が曲がった空間をもつ場合への一般化

[S.Aoki-SY '17]

NPB 933 (2018)

境界が曲がった空間をもつ場合への一般化

共形場理論が存在するような多様体を考える $\square$ 共形平坦な多様体(conformally flat manifold).

共形平坦な多様体 M_d 上でのフロー方程式は？

$$(ds^2)_{M_d} = g^{\frac{1}{d}}(x) \delta_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu$$

“適切な”自由フロー方程式

(プライマリーフロー方程式)

$$\frac{\partial}{\partial \tilde{t}} O(\Omega_x; \tilde{t}) = g^{-\frac{1}{d}}(x) g^{-\frac{\Delta}{2d}}(x) \partial^2 \cdot g^{\frac{\Delta}{2d}}(x) O(\Omega_x; \tilde{t}), \quad O(\Omega_x; 0) = O(\Omega_x) \quad \tilde{t} = g^{\frac{1}{d}}(x) t$$

誘導計量

$$\tilde{g}_{\tilde{\tau}\tilde{\tau}}(z) = R^2 \frac{\Delta}{\tilde{\tau}^2},$$

$$\tilde{g}_{\tilde{\tau}\mu}(z) = g_{\mu\tilde{\tau}}(z) = -R^2 \frac{\Delta}{\tilde{\tau}} \frac{\partial}{\partial x^\mu} \log\{g^{\frac{1}{2d}}(x)\},$$

非対角項が存在！

$$\tilde{g}_{\mu\nu}(z) = R^2 \Delta \left[\frac{\partial}{\partial x^\mu} \log\{g^{\frac{1}{2d}}(x)\} \frac{\partial}{\partial x^\nu} \log\{g^{\frac{1}{2d}}(x)\} + \frac{\delta_{\mu\nu} g^{\frac{1}{d}}(x)}{\tilde{\tau}^2} \right],$$

共形平坦な多様体 M_d を境界に持つ AdS 空間になっている！

実は、この計量は通常の Poincare スライスをとった AdS 空間と微分同相でつながる！

$$ds^2(\tilde{t}, x) = ds_{\text{PAdS}}^2(t, x)|_{t=g^{-1/d}(x)\tilde{t}}$$

ホログラフィーを用いた量子補正の計算

[S.Aoki-J.Balog-SY '18]

PTEP 2019 (2019) no.4, 043B06

ホログラフィーを用いた量子補正の計算

① 前幾何作用素の定義:

$$\mathcal{O}[g] \rightarrow \mathcal{O}[\hat{g}] =: \hat{\mathcal{O}}$$

② アインシュタインテンソルの期待値を $1/n$ 展開で計算

$$\langle G_{AB}[\hat{g}] \rangle = G_{AB}[\langle \hat{g} \rangle] + \langle G_{AB}[\hat{g}] \rangle_c$$

③ 期待値をバルクのエネルギーテンソルと解釈

$$\langle \hat{G}_{AB} \rangle_\psi = T_{AB}^{\text{bulk}} |.$$

具体例

$O(n)$ 自由ベクトル模型、真空期待値 $\square$ 宇宙項だけ $T_{AB}^{\text{bulk}} | = -\Lambda g_{AB}$

結果

$$\Lambda = -\frac{d(d-1)}{2L^2\Delta} \left(1 + \frac{d+4}{2n} \right) + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^2}\right), \quad L_{\text{AdS}}^2 = L^2\Delta \left(1 - \frac{d+4}{2n} \right) + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

自由な場の理論でも量子補正あり(真空泡グラフ)!!

非相対論的共形場理論への拡張

[Aoki-SY-Yoshida '19]

PRD (2019) no.12, 126002

[Aoki-Balog-SY-Yoshida '19]

非相対論的共形場理論への拡張

d次元非相対論的CFTを考えプライマリースカラー場 $\mathcal{O}$ を含むとする。

2点関数 $\langle O(\vec{x}_1, x_1^+, x_1^-) O^\dagger(\vec{x}_2, x_2^+, x_2^-) \rangle = \frac{1}{(x_{12}^+)^{\Delta_{\mathcal{O}}}} f\left(x_{12}^- + \frac{\vec{x}_{12}^2}{2x_{12}^+}\right). \quad x^+ = t$

非相対論的共形場理論への拡張

d次元非相対論的CFTを考えプライマリースカラー場 O を含むとする。

2点関数 $\langle O(\vec{x}_1, x_1^+, x_1^-) O^\dagger(\vec{x}_2, x_2^+, x_2^-) \rangle = \frac{1}{(x_{12}^+)^{\Delta_O}} f\left(x_{12}^- + \frac{\vec{x}_{12}^2}{2x_{12}^+}\right). \quad x^+ = t$

非相対論的自由フロー方程式

$$\frac{\partial \phi(x; \eta)}{\partial \eta} = (2i\bar{m}\partial_- + 2\partial_+\partial_- + \vec{\partial}^2)\phi(x; \eta), \quad \phi(x; 0) = O(x)$$

$$\rightarrow \phi(x; \eta) = \int d^d y K(x - y; \eta) \phi(y). \quad K(x; \eta) = \exp[-i\bar{m}x^-] \frac{e^{\frac{-2x^+x^- - \vec{x}^2}{4\eta}}}{\sqrt{4\pi\eta}^D}$$

非相対論的共形場理論への拡張

d次元非相対論的CFTを考えプライマリースカラー場 O を含むとする。

2点関数 $\langle O(\vec{x}_1, x_1^+, x_1^-) O^\dagger(\vec{x}_2, x_2^+, x_2^-) \rangle = \frac{1}{(x_{12}^+)^{\Delta_O}} f\left(x_{12}^- + \frac{\vec{x}_{12}^2}{2x_{12}^+}\right). \quad x^+ = t$

非相対論的自由フロー方程式

$$\frac{\partial \phi(x; \eta)}{\partial \eta} = (2i\bar{m}\partial_- + 2\partial_+\partial_- + \vec{\partial}^2)\phi(x; \eta), \quad \phi(x; 0) = O(x)$$

フロー

$$\rightarrow \phi(x; \eta) = \int d^d y K(x-y; \eta) \phi(y). \quad K(x; \eta) = \exp[-i\bar{m}x^-] \frac{e^{\frac{-2x^+x^- - \vec{x}^2}{4\eta}}}{\sqrt{4\pi\eta}^D}$$

2点関数 $\langle \phi(x_1; \eta_1) \phi^\dagger(x_2; \eta_2) \rangle = \frac{1}{\eta_+^{\Delta_O}} F\left(\frac{2(x_{12}^+ + 2i\bar{m}\eta_+)x_{12}^- + (\vec{x}_{12})^2}{\eta_+}, \frac{x_{12}^+}{\eta_+}; 1\right)$

新しく付け加えられた項のおかげでぶつかっても発散しない！

$$\rightarrow \langle \sigma(x_1; \eta_1) \sigma^\dagger(x_2; \eta_2) \rangle = \left(\frac{4\eta_1\eta_2}{\eta_+^2}\right)^{\Delta_O/2} G\left(\frac{2(x_{12}^+ + 2i\bar{m}\eta_+)x_{12}^- + (\vec{x}_{12})^2}{\eta_+}, \frac{x_{12}^+}{\eta_+}\right)$$

非相対論的共形場理論への拡張

Def.

誘導計量

$$ds^2 = \frac{1}{2} (\langle \partial_M \sigma^\dagger \partial_N \sigma \rangle + \langle \partial_M \sigma \partial_N \sigma^\dagger \rangle) dx^M dx^N$$

結果

$$ds^2 = \frac{-G^{(0,2)}(\vec{0})}{4\eta^2} (dx^+)^2 + 2 \left(\frac{-G^{(1,0)}(\vec{0}) - 2i\bar{m}G^{(1,1)}(\vec{0})}{\eta} \right) dx^+ dx^- + 4\bar{m}^2 G^{(2,0)}(\vec{0}) (dx^-)^2 \\ + \frac{\Delta_{\mathcal{O}}}{4\eta^2} d\eta^2 + \frac{-\delta_{ij} G^{(1,0)}(\vec{0})}{\eta} dx^i dx^j$$

非相対論的共形場理論への拡張

Def. 誘導計量 $ds^2 = \frac{1}{2}(\langle \partial_M \sigma^\dagger \partial_N \sigma \rangle + \langle \partial_M \sigma \partial_N \sigma^\dagger \rangle) dx^M dx^N$

結果

$$ds^2 = \frac{-G^{(0,2)}(\vec{0})}{4\eta^2} (dx^+)^2 + 2\left(\frac{-G^{(1,0)}(\vec{0}) - 2i\bar{m}G^{(1,1)}(\vec{0})}{\eta}\right) dx^+ dx^- + 4\bar{m}^2 G^{(2,0)}(\vec{0}) (dx^-)^2 \\ + \frac{\Delta_{\mathcal{O}}}{4\eta^2} d\eta^2 + \frac{-\delta_{ij} G^{(1,0)}(\vec{0})}{\eta} dx^i dx^j$$

1) G が一般の関数であれば $\rightarrow$ Lifshitz_{d+1} $\times$ $\mathbf{R}$ with $Z=2$

2) $G^{(2,0)}(\vec{0}) = G^{(1,1)}(\vec{0}) = 0 \rightarrow$ Schrodinger_{d+2}

$\rightarrow$ 非相対論的混成幾何
(NR hybrid geometry)

非相対論的共形場理論への拡張

Def. 誘導計量 $ds^2 = \frac{1}{2}(\langle \partial_M \sigma^\dagger \partial_N \sigma \rangle + \langle \partial_M \sigma \partial_N \sigma^\dagger \rangle) dx^M dx^N$

結果

$$ds^2 = \frac{-G^{(0,2)}(\vec{0})}{4\eta^2} (dx^+)^2 + 2\left(\frac{-G^{(1,0)}(\vec{0}) - 2i\bar{m}G^{(1,1)}(\vec{0})}{\eta}\right) dx^+ dx^- + 4\bar{m}^2 G^{(2,0)}(\vec{0}) (dx^-)^2 + \frac{\Delta\mathcal{O}}{4\eta^2} d\eta^2 + \frac{-\delta_{ij}G^{(1,0)}(\vec{0})}{\eta} dx^i dx^j$$

1) G が一般の関数であれば $\rightarrow$ Lifshitz_{d+1} $\times$ $\mathbb{R}$ with $Z=2$

$\rightarrow$ 非相対論的混成幾何
(NR hybrid geometry)

2) $G^{(2,0)}(\vec{0}) = G^{(1,1)}(\vec{0}) = 0 \rightarrow$ Schrodinger_{d+2}

Einstein-Maxwell-Higgs系に重カゲージ固定項を加えたものが再現

$$S = \int d^{D+1}x \sqrt{-g} \left(\frac{1}{2\kappa^2} (R - 2\Lambda) - \frac{1}{4} g^{\mu\nu} g^{\rho\sigma} F_{\mu\rho} F_{\nu\sigma} - g^{\mu\nu} D_\mu \Phi^\dagger D_\nu \Phi - V(|\Phi|) + \frac{-1}{2\xi} (g^{--})^2 \right)$$

非相対論的共形場理論への拡張

Def. 誘導計量 $ds^2 = \frac{1}{2}(\langle \partial_M \sigma^\dagger \partial_N \sigma \rangle + \langle \partial_M \sigma \partial_N \sigma^\dagger \rangle) dx^M dx^N$

結果

$$ds^2 = \frac{-G^{(0,2)}(\vec{0})}{4\eta^2} (dx^+)^2 + 2\left(\frac{-G^{(1,0)}(\vec{0}) - 2i\bar{m}G^{(1,1)}(\vec{0})}{\eta}\right) dx^+ dx^- + 4\bar{m}^2 G^{(2,0)}(\vec{0}) (dx^-)^2 + \frac{\Delta\mathcal{O}}{4\eta^2} d\eta^2 + \frac{-\delta_{ij}G^{(1,0)}(\vec{0})}{\eta} dx^i dx^j$$

1) G が一般の関数であれば $\rightarrow$ Lifshitz_{d+1} $\times$ $\mathbb{R}$ with $Z=2$

$\rightarrow$ 非相対論的混成幾何 (NR hybrid geometry)

2) $G^{(2,0)}(\vec{0}) = G^{(1,1)}(\vec{0}) = 0 \rightarrow$ Schrodinger_{d+2}

Einstein-Maxwell-Higgs系に重カゲージ固定項を加えたものが再現

$$S = \int d^{D+1}x \sqrt{-g} \left(\frac{1}{2\kappa^2} (R - 2\Lambda) - \frac{1}{4} g^{\mu\nu} g^{\rho\sigma} F_{\mu\rho} F_{\nu\sigma} - g^{\mu\nu} D_\mu \Phi^\dagger D_\nu \Phi - V(|\Phi|) + \frac{-1}{2\xi} (g^{--})^2 \right)$$

バウンダリー
粗視化の方法 ($\bar{m}$)

バルク
微分同相のゲージ (ξ)

有限温度、
ブラックホール

超対称フロー幾何
 $N=4\text{SYM} \leftrightarrow \text{AdS5}$

因果律、局所性

励起状態の幾何
ドジッター空間

やれることはまだまだ...

2019年11月@大森

**ご還暦おめでとうございます!
益々のご活躍を楽しみにしています!!**