

西宮湯川記念科学セミナー

2014年12月6日@フレンテホール、西宮市

超ひも理論の最前線： ブラックホールから ホログラフィー原理へ

高柳 匡

京都大学基礎物理学研究所



京都大学基礎物理研究所

当研究所は、湯川秀樹博士のノーベル物理学賞を記念して、1953年に我が国初の共同利用研究所として創設されました。

理論物理学のほぼすべての分野(素粒子、原子核、宇宙、物性)の第一線の研究者が揃っております。


湯川記念室はどなたでも見学することができます。



①はじめに

ひも理論（超弦理論, Superstring Theory）とは？

物質を細かく分けて行って、最小単位を探求する
学問が、素粒子物理。



この素粒子の考え方は、物質間に働く

- (1) 電磁気力 (静電気、磁石の力)
- (2) 強い力 (核力、原子核を作る力)
- (3) 弱い力 (ベータ崩壊、ニュートリノ)

という 3 種類の力を考えた場合は、うまくいく。


これらの力を統一的に説明する理論は、**標準模型**と呼ばれており、現在では確立している。

この**標準模型**に対して加速器を用いた様々な実験的検証は既になされており、2012年の**LHC加速器によるヒッグズ粒子の発見**は、そのクライマックス。

ミクロな構造を探求する実験装置

光学顕微鏡 $\Rightarrow$ 電子顕微鏡 $\Rightarrow$ 加速器

解像度 $= 10^{-7} m$ 解像度 $= 10^{-10} m$ 解像度 $= 10^{-19} m$




波長とエネルギー
は反比例する。

しかし、4つ目の力である、**重力（万有引力）**をミクロな立場で理解しようとするとも問題が生じる。[非常にミクロ！ プランク長 $= 10^{-35} m$]


「ミクロ = 高エネルギー」の極限

- ⇒ 重力の強さが、どんどん無限に大きくなり、それ以外の力は、逆に小さくなる。
- ⇒ サイズがゼロの粒子ではなく、**有限の大きさの物体**が物質の最小単位であればよい。

この問題を解決するために、「物質の最小単位は粒子ではなく、ひも（弦）である」という大前提に立った理論が**ひも理論**である。



さらに驚くべきことは、ひも理論は、**4つの力が自然に統一**される、




という大変魅力的な理論である。

でも、ひも理論は本当に正しいのだろうか？

正しい物理理論 $\Rightarrow$ 物理現象を正しく解明する

そこで、ひも理論を用いて初めて説明できるような物理現象（重力のミクロな性質）を探そう！

 **ブラックホールの物理**に着目する！
（ひも理論の良い「(思考)実験室」）



内容


- ① はじめに
- ② ブラックホールの物理
- ③ ひも理論で探るブラックホール
- ④ 量子エンタングルメントとホログラフィー
- ⑤ おわりに

② ブラックホールの物理

(2-1) ブラックホールとは？


半径が小さく、非常に重い天体。強い重力で引き付けるため、光ですら出てくることができない。





アインシュタインの一般相対論に従うと、
ブラックホールの半径 r_s の中では、すべて
物質が内部に吸い込まれる。

ブラックホールの中は見えない！



ブラックホール
(質量 m)


$$r_s = 2G_N m / c^2$$

G_N : 重力定数
(ニュートン定数)

(2-2) ブラックホールのエントロピーと熱力学

ブラックホールは万有引力で、重い物体が多数引きつけられて形成される天体である。

いったん、ブラックホールが形成されると、もとの物体の情報（色、形など）は分からなくなる。



物理学では、そのような「見えなくなった情報」の量をエントロピー (S と書く)と呼ぶ：

$$\text{識別できない状態の数} = 2^S$$

例：表向きか裏向きか分からないコインがある場合：

$$2 = 2^S \Rightarrow S = 1 \quad .$$

そのようなコインが N 個ある場合：

$$2^N = 2^S \Rightarrow S = N \quad .$$

つまり、「エントロピー＝表裏識別不可なコインの数」

このような動機で、ベッケンシュタインは、
ブラックホールにはエントロピーがあると予想した。その後、ホーキングによって、次の公式が発見された：


$$S_{BH} = \frac{k_B c^3}{4\hbar} \times \frac{A}{4G_N}$$

A : ブラックホールの面積

G_N : ニュートン定数

k_B : ボルツマン定数 (→ 統計力学)

$\hbar$: プランク定数 (→ 量子力学)



ホーキング博士

つまりブラックホールのエントロピーは、
体積ではなく、面積に比例する！

通常物質の熱力学では、エントロピーや
エネルギーは、常に体積に比例するので、
とても不思議である！

➡ ブラックホールの持っている自由度は、
見た目よりも次元低い！



ブラックホールの情報は、
すべて表面蓄えられている。


2次元面から、3次元立体画像
を再現する「ホログラム」と
似ている（しかし原理は異なる）



このように重力理論では、自由度が1次元低く見える。この現象を重力の本質とみなして、**ホログラフィー原理**と呼ぶ。

ホログラフィー原理

宇宙の理論(重力理論) = 宇宙の端の**物質**の理論



(2-3)ブラックホールは蒸発する？


ブラックホールには、エントロピーがあることから予想されるように、熱力学と類似した性質がある。これを**ブラックホールの熱力学**と呼ぶ。

温度	T	↔	表面の重力の強さ
エネルギー	E	↔	ブラックホールの質量
エントロピー	S	↔	ブラックホールの表面積

熱力学で知られる法則もブラックホールに対して成り立つ。 $\Delta E = T \cdot \Delta S$

ブラックホールは、温度を持っているので、
電磁波(=光)を放射する（ホーキング輻射）。

注）一般相対論（古典論）では、ブラックホールからは光
すら抜け出せないが、この輻射は量子効果で起こる。



では、ブラックホールの中にあった情報はどこに行っただろうか？

本当に情報が消えてしまうと量子力学の原理（ユニタリー性）と矛盾してしまう！

ブラックホールの情報損失のパラドクス

そこで、重力をミクロに記述できる、ひも理論を用いて、ブラックホールのミクロな物理を理解したい。

③ひも理論で探る ブラックホール


(3-1) ブラックホールエントロピーのミクロな解釈

ブラックホールを生成するには、とても重い物質が必要になるが、ひも理論においてそのような物質の良い候補が「**Dブレーン**」と呼ばれるものである。


Dブレーン

=開いたひもが張り付く物体

≡閉じたひもの凝縮したもの



ブラックホール = Dブレーン+ひもの集合体



(3-2) ひも理論のホログラフィー原理

Dブレーンを用いると、ホログラフィー原理が理解できる。(AdS/CFT対応, 1997 マルダセナ)


ホログラフィー原理の例

反ドジッター宇宙の重力理論
[$(d+1)$ 次元] = 物質(Dブレーン)を記述するミクロな理論
[d 次元]


閉じたひもの理論 = 開いたひもの理論

ホログラフィー原理の概念図

重力理論 = 境界上の「物質」




閉じたひもの理論
= 重力の理論



等価




開いたひもの理論




多数のDブレーン

ブラックホールの熱力学




物質の熱力学

ホログラフィーの本質 1 : ひもの双対性



ホログラフィーの本質 2：ふるいの仕掛け



(3-3)ブラックホールの情報損失パラドクスの解決

ホログラフィー原理から、ブラックホールの蒸発も、通常の物質に起こるような「液体が気体に蒸発する現象」と同じになる。




従って、情報の損失は、実際には起こらないはずと結論付けられる。

しかし、そのメカニズムの詳細は完全に解明されてはおらず、現在議論の的になっている。


有力なアイデア：BHの相補性 [サスキンド]

(1) ブラックホールの
外にいる観測者



物を落とすとBHの周りに薄い層(弦の集合?)が形成される。

(2) ブラックホールに
自由落下する観測者




何も起きず、スムーズに
ブラックホールの中に入る

(3-3)ホログラフィー原理の物質科学への応用の試み

このホログラフィー原理を、逆に利用して、様々な強結合物質の性質の解明に役立てようという研究も活発に行われている。

例：(高温)超伝導体



ブラックホール解など
(一般相対論)



計算が容易

一対一対応

強く相互作用した
物質 (量子多体系)



計算が難しい

具体的な成功例

(1) 強結合液体の粘性 [Kovtun-Son-Starinets 2004]

普遍的な公式：

$$\frac{\eta}{s} = \frac{\hbar}{4\pi k_B}$$

(η =粘性、 s =エントロピー密度)

クォーク・グルーオンプラズマ(QGP)
や冷却された原子(Cold atom)の実験で近い値が
得られている。従来理論では説明が困難！

(2) 強結合金属(異常な金属)の低温比熱

[小川-高柳-宇賀神 2010]

普遍的な制限：

$$C = (\text{定数}) \times T^{\alpha}, \quad \alpha \leq \frac{2}{3}.$$

(C=比熱、T=温度)

実際、高温超伝導体の異常金属相のような強結合金属においてこのような振る舞いが知られている。一方で、通常の金属(金銀銅鉄など)では $\alpha = 1$.

これまでの話のまとめ

素粒子論⇒物質の最小単位の解明が目標

超ひも理論⇒重力も含めたミクロな理論の構築
⇒[例]ブラックホールのミクロな構造

ではもっと一般に、**我々の宇宙のミクロな構造は？**
「宇宙の最小単位」？

⇒ 最近、興味深いヒントが得られた！

④量子エンタングルメントとホログラフィー

量子エンタングルメントとは？



ミクロな世界の物理 $\Rightarrow$ 量子力学

量子力学の基本的なアイデア： 粒子 = 波



例： 電磁波 = 光子
電子波 = 電子



波は「重ね合わせ」できる（関数の足し算: $f(x)+g(x)$ ）。

ある状態 =  + 

コインが表 コインが裏

このような状態では、コインが表である確率も裏である確率も50パーセントずつで、どちらかであるとは断言できない。


一方、古典力学（ニュートン力学）では、どちらかの状態しか許さない。

量子エンタングルメント（量子もつれ合い）

2つのコイン(AとBとする)があると、次のように様々な状態を考えることができる。

[例 1] 古典的な状態(直積状態)

$$\text{状態} = [\text{red wave}]_A \times [\text{green wave}]_B$$



Aは必ず表で、Bは必ず裏であり、両者に相関なし。
(エンタングルメントなし。)

[例 2] 量子論的状态(エンタングルした状态)

$$\text{状态} = [\text{red wavy}]_A \times [\text{green wavy}]_B + [\text{green wavy}]_A \times [\text{red wavy}]_B$$


二つの反対の状态が半々の確率で混じっている。

この時、コイン A を観測して表であれば、コイン B は必ず裏であることになる。もし B が観測できないと A の 1 ビットの情報 (= 2 つの可能性) を失う。

このような A と B の相関が量子エンタングルメント。
A B の対をエンタングルメント対 (EPR 対) と言う。

エンタングルメント・エントロピー

この量子エンタングルメントという考え方は、とても抽象的。物理学で利用するには、定量的にあらわすことが必要。

⇒ 量子エンタングルメントの強さを測る量が
エンタングルメント・エントロピー。

エンタングルメント・エントロピー

= AとBの間のエンタングルメント対の数


= Bが見えない時に識別不可なAのコインの数

ホログラフィックなエンタングルメント公式

[笠-高柳 2006]


講演者らの研究で、ミクロな情報量に相当するエンタングルメント・エントロピー(S_A)が、ホログラフィー原理を用いて

$$S_A = \frac{\Sigma_A \text{の面積の最小値}}{4G_N} \cdot$$



と幾何学的に計算できることが分かった!

⇒重力理論の宇宙に「エンタングルメント対」
が満ちているという描像を示唆している。



$$S_A = \frac{\Sigma_A \text{の面積の最小値}}{[\text{プランク長}]^2}$$
$$=[\Sigma_A \text{と交差するエンタングルメント対の数}].$$

さらに発展させると以下の予想に到達する：


[2009~現在、複数の研究者]

重力理論の「宇宙」


= 量子エンタングルメントのネットワーク




ミクロな宇宙



プランクスケール




マクロな宇宙



いわば、**時空の「素粒子」** = 量子エンタングルメント。


ホログラフィー(AdS/CFT対応)

双曲面のタイル張り
(エッシャー「天使と悪魔」)



=

量子エンタングルメント
のネットワーク



曲がった時空の重力理論

量子多体系


宇宙は、量子エンタングルメントのブロックで作られている！

⑤おわりに

以上では、**超ひも理論**がブラックホールなどの重力現象の解明にどのように役に立つのか説明した。

鍵となる考え方： **情報の量＝面積**

さらに発展させると**ホログラフィー原理**という考えに行きつく。⇒超ひも理論の研究が様々な他の分野と密接に関係することが分かってきた。



一方で、ひも理論が解決すべき最も重要な問題は、

「我々の宇宙がどのように創成されたのか？」

という根本的な疑問である。現在でも、まだまだ暗中模索の状況であるが、ホログラフィー原理と量子エンタングルメントの考察からの予想：

「宇宙」＝量子エンタングルメントの集合体


などは重要なヒントになるように思える。

さらに詳しい内容に興味を持たれる方へ：
（大学院生用のテキストなので、
大学生の物理の知識を仮定。）

拙著

「ホログラフィー原理
と量子エンタングルメント」

SGCライブラリ106
臨時別冊・数理科学
2014年4月



ご清聴ありがとうございました！