3次元超対称ゲージ理論の局所化 と行列模型

細道和夫（基研）

2012年2月20日, 立教大学

@研究会「行列模型とその周辺」

3次元球面上のSUSYゲージ理論

の物理量が**行列模型**で計算できる。

-- Kapustin-Willett-Yaakov ('09) によって始められる

* cf) Sen('87,'90), Romelsberger('05) : 4D theories on $\mathbb{R} \times S^3$

-- 任意の N=2 SUSY 理論に一般化

Jafferis('10), Hama-KH-Lee('10)

-- 丸くない球面へ拡張

Hama-KH-Lee('11), Imamura-Yokoyama('11)

工程

1. Killing Spinor 方程式を調べる
2. ラグランジアンと変換則を求める
3. 局所化原理をつかって厳密な経路積分

曲がった空間上の Rigid SUSY

... Killing Spinor (KS) に対応する

$$D_\mu \varepsilon \equiv \left(\partial_\mu + \frac{1}{4} \Gamma_{ab} \omega_\mu^{ab} \right) \varepsilon = \Gamma_\mu \tilde{\varepsilon} \quad \text{for some } \tilde{\varepsilon}$$

まるい 3-球面上には 4 つの KS がある。 $D_\mu \varepsilon = \pm \frac{i}{2} \Gamma_\mu \varepsilon$

$$x_0^2 + x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1 \quad \text{in } \mathbb{R}^4$$

$$ds^2 = \mu^1 \mu^1 + \mu^2 \mu^2 + \mu^3 \mu^3$$

$$\mu^a = e_m^a d\xi^m : \text{左不変 1形式}$$

$$R^a = e^{am} \partial_{\xi^m} = 2iJ^a : \text{SU(2)}_{\text{右}} \text{ の生成子}$$

KS方程式には拡張がある。

例 1 : 楕円体 $S_b^3 : b^2(x_0^2 + x_1^2) + b^{-2}(x_2^2 + x_3^2) = 1$

適当なゲージ場 (V_μ) を入れてKS方程式を拡張

$$D_\mu \varepsilon^\pm \equiv \left(\partial_\mu + \frac{1}{4} \Gamma_{ab} \omega_\mu^{ab} \mp iV_\mu \right) \varepsilon^\pm = \Gamma_\mu \tilde{\varepsilon}^\pm$$

すると、初めて解がある。

KS方程式には拡張がある。

例2 : Squashed 3球面 (Imamura-Yokoyama '11)

$$ds^2 = \mu^1 \mu^1 + \mu^2 \mu^2 + s^2 \mu^3 \mu^3 \quad (s < 1)$$

適当なベクトル場 (V_m) をいれてKS方程式を拡張

$$\left(\partial_\mu + \frac{1}{4} \Gamma_{ab} \omega_\mu^{ab} \right) \varepsilon^\pm = -\frac{is}{2} \Gamma_\mu \varepsilon^\pm \pm \underline{tV^\nu \Gamma_{\mu\nu} \varepsilon^\pm}$$

$$(t \equiv \sqrt{1-s^2})$$

$$b \equiv s + it \quad (|b|=1)$$

すると、解がある。

その他の拡張の方法？

「めのこ」でKS方程式を拡張した場合、
その解を用いてSUSY理論が構成できるかわからない。

超重力理論を用いて一般的議論ができる。

(Festuccia-Seiberg '11)

KS 方程式 $\longleftrightarrow$ Gravitino のSUSY変換が零になるべし

3D N=2 SUSY理論

multiplets:	“gauge”	“matter”
ラベル	G Lie algebra	R Rep of G q U(1) R-charge
場	σ real scalar λ spinor A_μ vector D aux. scalar	ϕ complex scalar ψ spinor F aux. scalar

変換則, ラグランジアン

$\mathbb{R}^3$ 上の表式を Noether 手続きで補正して決まる

Vector multiplet:

$$\delta A_\mu = -\frac{i}{2}(\bar{\epsilon}\gamma_\mu\lambda - \bar{\lambda}\gamma_\mu\epsilon),$$

$$\delta\sigma = \frac{1}{2}(\bar{\epsilon}\lambda - \bar{\lambda}\epsilon),$$

$$\delta\lambda = \frac{1}{2}\gamma^{\mu\nu}\epsilon F_{\mu\nu} - D\epsilon + i\gamma^\mu\epsilon D_\mu\sigma + \frac{2i}{3}\sigma\gamma^\mu D_\mu\epsilon,$$

$$\delta\bar{\lambda} = \frac{1}{2}\gamma^{\mu\nu}\bar{\epsilon}F_{\mu\nu} + D\bar{\epsilon} - i\gamma^\mu\bar{\epsilon}D_\mu\sigma - \frac{2i}{3}\sigma\gamma^\mu D_\mu\bar{\epsilon},$$

$$\delta D = -\frac{i}{2}\bar{\epsilon}\gamma^\mu D_\mu\lambda - \frac{i}{2}D_\mu\bar{\lambda}\gamma^\mu\epsilon + \frac{i}{2}[\bar{\epsilon}\lambda, \sigma] + \frac{i}{2}[\bar{\lambda}\epsilon, \sigma] \\ - \frac{i}{6}(D_\mu\bar{\epsilon}\gamma^\mu\lambda + \bar{\lambda}\gamma^\mu D_\mu\epsilon).$$

Chiral multiplet of U(1) R-charge q :

$$\delta\phi = \bar{\epsilon}\psi,$$

$$\delta\psi = i\gamma^\mu\epsilon D_\mu\phi + i\epsilon\sigma\phi + \frac{2qi}{3}\gamma^\mu D_\mu\epsilon\phi + \bar{\epsilon}F,$$

$$\delta F = \epsilon(i\gamma^\mu D_\mu\psi - i\sigma\psi - i\lambda\phi) + \frac{i}{3}(2q - 1)D_\mu\epsilon\gamma^\mu\psi.$$

ラグランジアン

CS term:

$$\mathcal{L}_{\text{CS}} = \frac{1}{4\pi i} \text{Tr} \left[\frac{1}{\sqrt{g}} \varepsilon^{\mu\nu\lambda} (A_\mu \partial_\nu A_\lambda - \frac{2i}{3} A_\mu A_\nu A_\lambda) - \bar{\lambda} \lambda + 2D\sigma \right].$$

YM term:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{\text{YM}} = \text{Tr} & \left(\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} + \frac{1}{2} D_\mu \sigma D^\mu \sigma + \frac{1}{2} \left(D + \frac{\sigma}{\ell} \right)^2 \right. \\ & \left. + \frac{i}{2} \bar{\lambda} \gamma^\mu D_\mu \lambda + \frac{i}{2} \bar{\lambda} [\sigma, \lambda] - \frac{1}{4\ell} \bar{\lambda} \lambda \right). \end{aligned}$$

Matter kinetic term:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{\text{mat}} = & D_\mu \bar{\phi} D^\mu \phi + \bar{\phi} \sigma^2 \phi + \frac{i(2q-1)}{\ell} \bar{\phi} \sigma \phi + \frac{q(2-q)}{\ell^2} \bar{\phi} \phi + i\bar{\phi} D\phi + \bar{F} F \\ & - i\bar{\psi} \gamma^\mu D_\mu \psi + i\bar{\psi} \sigma \psi - \frac{(2q-1)}{2\ell} \bar{\psi} \psi + i\bar{\psi} \lambda \phi - i\bar{\phi} \bar{\lambda} \psi. \end{aligned}$$

その他の不変量: FI term, Superpotential, real mass term.

注意:

1. $\mathcal{L}_{\text{YM}}$ と $\mathcal{L}_{\text{mat}}$ ($q \neq 1/2$ の場合)は
 $D_m \varepsilon = + \frac{i}{2\ell} \gamma_m \varepsilon$ の **SUSY** でのみ不変
.....

2. $\mathcal{L}_{\text{YM}}$ と $\mathcal{L}_{\text{mat}}$ は **SUSY exact**.

$$\bar{\varepsilon} \varepsilon \cdot \mathcal{L}_{\text{YM}} = \delta_{\bar{\varepsilon}} \delta_{\varepsilon} \text{Tr} \left(\frac{1}{2} \bar{\lambda} \lambda - 2D\sigma \right),$$

$$\bar{\varepsilon} \varepsilon \cdot \mathcal{L}_{\text{mat}} = \delta_{\bar{\varepsilon}} \delta_{\varepsilon} \left(\bar{\psi} \psi - 2i \bar{\phi} \sigma \phi + \frac{2(q-1)}{\ell} \bar{\phi} \phi \right).$$

3. matter 場の変換則、ラグランジアンに q 依存性が入る。

SUSY局所化原理

SUSYのある（経路）積分への非零の寄与は
次を満たす「固定点」に局所化する。

$$\delta_{\text{SUSY}} \Psi = 0 \quad \text{for all fields } \Psi.$$

3次元球面上の $\mathcal{N} = 2$ SUSY 理論の固定点では特に,

$$\mathcal{L}_{\text{YM}} = \delta_{\text{SUSY}}(\text{some fermion}) = 0.$$

$$\longrightarrow D_{\mu} \sigma = F_{\mu\nu} = D + \frac{\sigma}{l} = 0$$

$$\mathcal{L}_{\text{mat}} = \delta_{\text{SUSY}}(\text{some fermion}) = 0.$$

$$\longrightarrow \phi = F = 0$$

$$\int D(\text{fields}) e^{-S} \longrightarrow \int d\sigma_0(\dots)$$

Path integral

Matrix integral

σ_0 (=固定点集合の座標) 以外の積分は
ガウス近似が**exact**.

これは、作用を **SUSY-exact** な量でずらしても
分配関数の値が変わらないことによる。

$$S \rightarrow S + t \delta_{\text{SUSY}} V \quad (\text{s.t. } \delta_{\text{SUSY}}^2 V = 0)$$

$\mathcal{L}_{\text{YM}}$ と $\mathcal{L}_{\text{mat}}$ はどちらもこのタイプ。

* 分配関数はYM結合定数によらない。

行列積分公式

$$Z = \int [d\sigma_0] \exp(-S_{\text{cl}}) \times \left(\frac{\text{Det} \Delta_F}{\text{Det} \Delta_B} \right)$$

* $[d\sigma_0]$: Lie代数上の積分

(対称性を用いて Cartan部分代数まで帰着できる)

* $\text{Det} \Delta_{B,F}$: “1-loop行列式”

* Δ_B, Δ_F : $\mathcal{L}_{\text{YM}}, \mathcal{L}_{\text{mat}}$ の2次近似から読み取れる波動演算子

N=2 SQED の例 : chiral multiplet (ϕ, ψ) の波動演算子は

$$\Delta_\phi = \frac{1}{\ell^2} \{4J^a J^a - (q - i\ell\sigma)(q - 2 - i\ell\sigma)\},$$

$$\Delta_\psi = \frac{1}{\ell} \{4J^a S^a + i\ell\sigma + 2 - q\}. \quad J^a, S^a : \text{SU}(2) \text{ generators}$$

楕円体上の分配関数:

(Hama-KH-Lee '11)

$$Z_{S_b^3} = \frac{1}{|\text{Weyl}(G)|} \int \prod_{i=1}^{\text{rank}G} d\sigma_i \cdot \Delta_{\text{gauge}}(\sigma) \Delta_{\text{mat}}(\sigma) \cdot e^{-S_{\text{cl}}}$$

$$\Delta_{\text{gauge}}(\sigma) = \prod_{\alpha \in \Delta_+} \sinh(b\pi\alpha \cdot \sigma) \sinh(b^{-1}\pi\alpha \cdot \sigma)$$

$$\Delta_{\text{mat}}(\sigma) = \prod_{\rho: \text{weights of } R} s_b \left(\frac{iQ}{2} (1 - q) - \rho \cdot \sigma \right)$$

[double-sine function]

$$s_b(x) = \prod_{m, n \geq 0} \frac{mb + nb^{-1} + \frac{Q}{2} - ix}{mb + nb^{-1} + \frac{Q}{2} + ix}, \quad Q \equiv b + b^{-1}$$

応用

- * M5-brane ($6=3+3$)
- * M2-branes (ABJM模型など)

6=3+3への応用

(Dimofte-Gaiotto-Gukov, Cecotti-Cordova-Vafa)

3D N=2 SUSY ゲージ理論の S_b^3 分配関数
= SL(n) Chern-Simons理論の経路積分

ABJ(M)模型への応用

$U(N_1)_k \times U(N_2)_{-k}$ Chern-Simons理論

with * chirals $X_1, X_2 : (N_1, \bar{N}_2)$

$Y_1, Y_2 : (\bar{N}_1, N_2)$

* 4次のsuperpotential

$N_1 = N_2 = N$ のとき、 $C^4/\mathbb{Z}_k$ 上の N 枚の M2-brane の理論

行列積分公式をつかって分配関数を計算

注意

- * $N=3$ 以上のSUSYのとき、物質場はhypermultiplet をなす。
(=反対電荷の chiral multiplet の対、 $q = 1/2$)
- * hypermultiplet の球面上の行列式は簡単。

$$s_b\left(\frac{iQ}{2}(1-q) - \sigma\right) s_b\left(\frac{iQ}{2}(1-q) + \sigma\right) \Big|_{b=1, q=1/2}$$
$$= \frac{1}{2 \cosh \pi \sigma}$$

球面上の分配関数

(Drukker-Marino-Putrov '10)

$$\begin{aligned} Z_{\text{ABJ}}(N_1, N_2, g_s \equiv \frac{2\pi i}{k}) \\ = \frac{i^{-\frac{1}{2}(N_1^2 - N_2^2)}}{N_1! N_2!} \int \prod_{i=1}^{N_1} \frac{d\mu_i}{2\pi} \prod_{j=1}^{N_2} \frac{d\nu_j}{2\pi} \prod_{i < j}^{N_1} \left(2 \sinh \frac{\mu_i - \mu_j}{2} \right)^2 \prod_{i < j}^{N_2} \left(2 \sinh \frac{\nu_i - \nu_j}{2} \right)^2 \\ \prod_{i=1}^{N_1} \prod_{j=1}^{N_2} \left(2 \cosh \frac{\mu_i - \nu_j}{2} \right)^{-2} \exp \left[-\frac{1}{2g_s} \left(\sum_{i=1}^{N_1} \mu_i^2 - \sum_{i=1}^{N_2} \nu_i^2 \right) \right] \end{aligned}$$

Large-N 行列模型と思って固有値分布に基づく解析をすると強結合相での自由エネルギーのスケーリング則を再現できる。

$$F \simeq \frac{\sqrt{2}\pi}{3} k^{\frac{1}{2}} N^{\frac{3}{2}}$$

よくある質問

1. 分配関数の全体の規格化はどうするのか？
M2-brane の自由エネルギーの計算に重要では？
(Hさん)
2. CSレベルは量子補正でずれるのではなかったか？
(Oさん)

1. 全体の規格化の問題

- * chiral multiplet の1-loop行列式は規格化も込めて正しい。

2個の chiral 場 ϕ, ϕ' (R電荷 q, q' , U(1) ゲージ電荷 ± 1) の生じる行列式は

$$s_b\left(\frac{iQ}{2}(1-q) - \sigma\right) s_b\left(\frac{iQ}{2}(1-q') + \sigma\right)$$

$$= 1 \quad (q + q' = 2 \text{ のとき})$$

(F-term 変形で
脱落させられるので)

- * Gauge multiplet の寄与の規格化は正しくない。

Pure bosonic CS理論の厳密な結果 (Witten '89) と比較して決める。

CS理論の場合、 $G=U(N)$

$$Z = C \int \prod_{i=1}^N d\sigma_i \prod_{i<j} \left(2 \sinh \frac{\sigma_i - \sigma_j}{2} \right)^2 \cdot e^{i\pi k \sum_i \sigma_i^2}$$

Weylの分母公式で $\sinh$ を展開し、ガウス積分

$$= C \cdot (2\pi)^N N! i^{\frac{N^2}{2}} \cdot e^{\frac{i\pi N(N^2-1)}{6k}} \cdot k^{-\frac{N}{2}} \prod_{j=1}^{N-1} 2 \sin^{N-j} \left(\frac{j\pi}{k} \right)$$

↓
1!

Bosonic CS理論に内在する
位相不定性

↑
Wittenの厳密公式
(bosonic $SU(N)_{k-N}$ CS)

2. CSレベル k への量子補正

... は、 $\mathcal{N} = 2$ SUSY 理論では**無し**。

$\mathcal{N}$ -SUSY YM-CS 理論
における1-loop補正

$$\mathcal{L} = k\mathcal{L}_{\text{CS}}^{(\mathcal{N})} + \frac{1}{g^2}\mathcal{L}_{\text{YM}}^{(\mathcal{N})}$$

(Kao-Lee-Lee '95)

$$\mathcal{N} = 0 \quad \delta k = N$$

$$\mathcal{N} = 1 \quad \delta k = N\left(1 - \frac{1}{2}\right)$$

$$\mathcal{N} = 2 \quad \delta k = N\left(1 - \frac{2}{2}\right)$$

$$\mathcal{N} = 3 \quad \delta k = N\left(1 - \frac{3}{2} + \frac{1}{2}\right)$$

gauge boson

$\text{SO}(\mathcal{N})$ singlet fermion

$\text{SO}(\mathcal{N})$ $\mathcal{N}$ -plet fermion

2. CSレベル k への量子補正

$\mathcal{N} = 2$ U(N) YM-CS理論の分配関数を2通りに計算できる。

結論

3次元球面上の $N=2$ 超対称ゲージ理論の分配関数が
全体の規格化も含めて有限次元積分で書けている。