


No Smooth Spacetime in Lorentzian

Quantum Cosmology

京都大学 基礎物理学研究所

松井宏樹



[Collaborator: S. Mukohyama, A. Naruko,
M. Honda, K. Okabayashi, T. Terada]

[Phys.Rev.D 110 (2024) 2, 023503, Phys.Rev.D
107 (2023) 4, 043511, 2402.09981]


トークプラン

本講演では、宇宙の波動関数に対する新たな枠組みであるローレンツ量子宇宙論 (Lorentzian quantum cosmology) を紹介し、量子宇宙論の摂動論的問題について議論する。最初に、このローレンツ量子宇宙論に基づいて、宇宙創生を記述するHartle-Hawkingの無境界仮説とトンネル仮説が厳密に定式化されることを示す。さらに、この量子宇宙論の枠組みで、時空の摂動を考慮すると、無境界仮説とトンネル仮説が宇宙観測と深刻な矛盾を引き起こすことを明らかにし、その摂動的問題がTrans-Planckian物理においても解決できないことを示す。

1. ローレンツ量子宇宙論のReview

2. 量子宇宙論の摂動的問題について議論

3. プランク超物理に基づいた量子宇宙論の摂動的問題の議論



量子宇宙論

(Quantum Cosmology)

量子宇宙論 (Quantum Cosmology)

1. Wheeler-DeWitt 方程式 (正準量子化)

$$\mathcal{H}\Psi = \left[-16\pi G_N \mathcal{G}_{ijkl} \frac{\partial^2}{\partial g_{ij} \partial g_{kl}} + \frac{\sqrt{g}}{16\pi G_N} (-R + 2\Lambda) \right] \Psi = 0$$


2. Path Integral of quantum gravity (経路積分量子化)

$$\Psi(g, \phi) = \int^{(g, \phi)} \mathcal{D}g_{\mu\nu} \mathcal{D}\phi e^{iS[g_{\mu\nu}, \phi]/\hbar}$$

Hartle-Hawking 無境界仮説

無境界波動関数(無から創成した時空や物質を記述する波動関数)

Phys.Rev.D 28 (1983) 2960-2975



量子重力のユークリッド経路積分
(コンパクトでユークリッド時空を足し上げる)




$$\Psi_{\text{HH}} = \int_{\text{no-boundary}}^{(g,\phi)} \mathcal{D}g_{\mu\nu} \mathcal{D}\phi e^{-S_E[g_{\mu\nu}, \phi]/\hbar}$$

Lorentzian Quantum
Cosmology

Phys. Rev. D 95 (2017) 103508

$$\Psi = \int \frac{dN}{N^{1/2}} e^{\frac{i}{\hbar} \left[N^3 \frac{\Lambda^2}{36} + N \left(3 - \frac{\Lambda}{2} q_1 \right) - \frac{3}{4N} q_1^2 \right]}$$

Integrate over real N



Lorentzian Quantum Cosmology

Our setup

$$ds^2 = -\frac{N^2(t)}{q(t)} dt^2 + q(t) [\Omega_{ij}(\mathbf{x}) + h_{ij}(t, \mathbf{x})] dx^i dx^j$$

Lapse function

Scale factor

Tensor fields


Gravitational action is expanded up to the second order in the perturbation

$$S_{\text{GR}}^{(0)} = V_3 \int_{t=t_i}^{t=t_f} dt \left(-\frac{3}{4N} \dot{q}^2 + N(3K - \Lambda q) \right) + S_B ,$$

$$S_{\text{GR}}^{(2)} = V_3 \int_{t=t_i}^{t=t_f} N dt \sum_{snlm} \left[\frac{q^2}{8N^2} \left(\dot{h}_{nlm}^s \right)^2 - \frac{K}{8} \left((n^2 - 3) + 2 \right) (h_{nlm}^s)^2 \right] ,$$

$$h_{ij}(t, \mathbf{x}) = \sum_{snlm} h_{nlm}^s(t) Q_{ij}^{snlm}$$

$$n \geq 3, l \in [0, n-1], m \in [-l, l]$$



$$M_{\text{Pl}} = 1/\sqrt{8\pi G} = 1$$

$$V_3 = 2\pi^2$$

$$K = +1$$

Batalin-Fradkin-Vilkovisky (BFV) formalism

Path Integral of Quantum Gravity

$$G[q, h] \equiv \int \mathcal{D}q \mathcal{D}h \mathcal{D}p_q \mathcal{D}p_h \mathcal{D}\Pi \mathcal{D}N \mathcal{D}\rho \mathcal{D}\bar{c} \mathcal{D}\bar{\rho} \mathcal{D}c \exp(iS_{\text{BRS}}/\hbar)$$

Becchi-Rouet-Stora (BRS) invariant action

$$S_{\text{BRS}} \equiv \int_{t_i}^{t_f} dt \left(p_q \dot{q} + p_h \dot{h} - N\mathcal{H} + \Pi \dot{N} + \bar{\rho} \dot{c} + \bar{c} \dot{\rho} - \bar{\rho} \rho \right)$$

BRS symmetry transformation

Lagrange multiplier and ghost fields

$$\begin{aligned} \delta a &= \lambda c \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p_a}, \quad \delta p_a = -\lambda c \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial a}, \quad \delta h = \lambda c \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p_h}, \quad \delta p_h = -\lambda c \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial h}, \\ \delta N &= \lambda \rho, \quad \delta \bar{c} = -\lambda \Pi, \quad \delta \bar{\rho} = -\lambda \mathcal{H}, \quad \delta \Pi = \delta c = \delta \rho = 0 \end{aligned}$$

Lorentzian path integral

$$\begin{aligned} G[q, h] &= \int dN(t_f - t_i) \int \mathcal{D}q \mathcal{D}h \mathcal{D}p_q \mathcal{D}p_h \exp \left(i \int_{t_i}^{t_f} dt \left(p_q \dot{q} + p_h \dot{h} - N\mathcal{H} \right) / \hbar \right) \\ &= \int dN(t_f - t_i) \int \mathcal{D}q \mathcal{D}h \exp (iS_{\text{GR}}[q, h, N]/\hbar) \end{aligned}$$

Lorentzian Quantum Cosmology

Lorentzian path integral for no-boundary and tunneling proposal

$$G^{(0)}[q_f] = \int dN \int_{q(t=t_i)=0}^{q(t=t_f)=q_f} \mathcal{D}q \exp \left(i S_{\text{GR}}^{(0)}[N, q] / \hbar \right)$$

Scalar factor


$$q(t) = a(t)^2$$

No-boundary conditions

$$q(t_i = 0) = 0, \quad q(t_f = 1) = q_f$$

$$G^{(0)}[q_f; 0] = \int_0^\infty dN \sqrt{\frac{3iV_3}{4\pi\hbar N}} \exp \left(\frac{i S_{\text{on-shell}}^{(0)}[N]}{\hbar} \right) \quad H^2 = \frac{\Lambda}{3}$$

$$S_{\text{on-shell}}^{(0)}[N] = V_3 \left[\frac{N^3 H^4}{4} + N \left(-\frac{3H^2(q_f)}{2} + 3 \right) + \frac{1}{N} \left(-\frac{3}{4}(q_f)^2 \right) \right]$$



Picard-Lefschetz theory

$$G^{(0)}[q_f; 0] = \int_0^\infty dN \sqrt{\frac{3iV_3}{4\pi\hbar N}} \exp \left(\frac{iV_3}{\hbar} \left[\frac{N^3 H^4}{4} + N \left(-\frac{3H^2(q_f)}{2} + 3 \right) + \frac{1}{N} \left(-\frac{3}{4}(q_f)^2 \right) \right] \right)$$


Picard-Lefschetz theory

$$\int_{\mathcal{R}} dx e^{if(x)} \implies \int_{\mathcal{C}} dx e^{if(x)} = \sum_{\sigma} n_{\sigma} \int_{\mathcal{J}_{\sigma}} dz e^{if(z)}$$


Steepest descent (Lefschetz thimble)

Tunneling saddle points $N_{\text{T}} = \frac{1}{H^2} \left[i \pm (q_f H^2 - 1)^{1/2} \right]$

No-boundary saddle points $N_{\text{HH}} = \frac{1}{H^2} \left[-i \pm (q_f H^2 - 1)^{1/2} \right]$



Integration Contour ($0 < N < +\infty$)



J. Feldbrugge, J.-L. Lehners and N. Turok,
Phys. Rev. D 95 (2017) 103508

1 (tunneling) saddle point

$$N_s = \frac{1}{H^2} \left[i + (q_f H^2 - 1)^{1/2} \right]$$

Tunneling wave function

$$\Psi_T \sim e^{-\frac{12\pi^2}{\hbar\Lambda}}$$

Picard-Lefschetz and Resurgence Analysis

$$G(\hbar) = \sqrt{\frac{3iV_3}{4\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} dx \exp[F(x)] \quad F(x) := \frac{i}{\hbar} S_{\text{on-shell}}(x) \quad [\text{M. Honda, H. Matsui, K. Okabayashi, T. Terada, 2402.09981}]$$

$$S_{\text{on-shell}}(x) = \alpha x^6 + \beta x^2 + \frac{\gamma}{x^2} \quad \alpha = V_3 \frac{\Lambda^2}{36}, \quad \beta = V_3 \left(-\frac{\Lambda(q_i + q_f)}{2} + 3K \right), \quad \gamma = V_3 \left(-\frac{3}{4}(q_f - q_i)^2 \right)$$



$$12\alpha\gamma + \beta^2 < 0 \quad 12\alpha\gamma + \beta^2 > 0, \quad \beta > 0$$

No-boundary and tunneling proposal are on Stokes lines (thimble decomposition is ambiguous)

$$\hbar = e^{i\theta} |\hbar| \quad \theta \rightarrow 0_{\pm}$$

If there is ambiguity (Stokes jumps), the resurgence works

$$n_{x_s} |_{\theta \rightarrow 0_+} \neq n_{x_s} |_{\theta \rightarrow 0_-}$$



Resurgence Analysis

[M. Honda, H. Matsui, K. Okabayashi,
T. Terada, 2402.09981]

$$G(\hbar) = \sqrt{\frac{3iV_3}{4\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} dx \exp \left[i \left(\alpha \hbar^2 x^6 + \beta x^2 \right) \right] \quad x=0, \quad x_i = e^{\frac{i \arg \beta}{4}} e^{\frac{2n-1}{4} \pi i} \left(\frac{|\beta|}{3\alpha \hbar^2} \right)^{\frac{1}{4}} \quad (n=1, \dots, 4)$$

We expand it around $x=0$

Borel transformation

$$\text{sign}(\beta) = \pm 1$$

$$G_0(\hbar) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n \hbar^{2n} \quad \mathcal{B}G_0(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{c_n}{\Gamma(2n+1)} t^{2n} \quad \dots \rightarrow \quad \mathcal{B}G_0(t) = e^{\pm \frac{i\pi}{4}} \sqrt{\frac{3iV_3}{4|\beta|}} {}_2F_1 \left(\frac{1}{6}, \frac{5}{6}; 1; \frac{27t^2\alpha}{4\beta^3} \right)$$

Laplace transformation

$$\mathcal{S}_{\theta} G_0(\hbar) = \frac{1}{\hbar} \int_0^{\infty \cdot e^{i\theta}} dt e^{-\frac{t}{\hbar}} \mathcal{B}G_0(t)$$

$$(\mathcal{S}_{0+} - \mathcal{S}_{0-}) G_0(\hbar) = -\frac{1}{\hbar} \sqrt{\frac{3V_3}{4\beta}} \int_{t_0}^{\infty} dt e^{-\frac{t}{\hbar}} {}_2F_1 \left(\frac{1}{6}, \frac{5}{6}; 1; 1 - \frac{27t^2\alpha}{4\beta^3} \right)$$

$$(\mathcal{S}_{0+} - \mathcal{S}_{0-}) G_0(\hbar) = - \sum_{x_s=x_1, x_3} \left(G(\hbar)|_{x=x_s}^{\theta=0^+} - G(\hbar)|_{x=x_s}^{\theta=0^-} \right)$$

Borel ambiguity is canceled by
the ambiguity for the
nontrivial saddle points

Integration Contour of Lapse function


$$N > 0 \quad d\tau = N dt$$

J. Diaz Dorronsoro, J. J. Halliwell, J. B. Hartle, T. Hertog
and O. Janssen, Phys. Rev. D 96 (2017) 043505


$$G[q, h] = \int_0^\infty dN \int \mathcal{D}q \mathcal{D}h \exp(iS_{\text{GR}}[N, q, h]/\hbar)$$

$$-\infty < N < +\infty$$

$$G[q, h] = \int_{-\infty}^\infty dN \int \mathcal{D}q \mathcal{D}h \exp(iS_{\text{GR}}[N, q, h]/\hbar)$$



Integration Contour 1 ($-\infty < N < +\infty$)



Phys.Rev.D 97 (2018) 2, 023509


2 (tunneling) saddle points

$$N_s = \frac{1}{H^2} \left[i \pm (q_f H^2 - 1)^{1/2} \right]$$

Tunneling wave function

$$\Psi_T \sim e^{-\frac{12\pi^2}{\hbar\Lambda}}$$

Integration Contour 2 ($-\infty < N < +\infty$)



Phys. Rev. D 96 (2017) 043505,
Phys.Rev.D 97 (2018) 2, 023509

4 (all) saddle points

$$N_s = \frac{1}{H^2} \left[\pm i \pm (q_f H^2 - 1)^{1/2} \right]$$

No-boundary wave function

$$\Psi_{HH} \sim e^{+\frac{12\pi^2}{\hbar\Lambda}}$$

Perturbation Problem in Quantum Cosmology

Divergent perturbations

$$S_{\text{GR}}[q, h, N] = S_{\text{GR}}^{(0)}[q, N] + S_{\text{GR}}^{(2)}[h, N] + \mathcal{O}(h^3)$$

Background part

Perturbation part

[Phys.Rev.D 110 (2024) 2, 023503, Phys. Rev. D 107 (2023) 043511, Phys.Rev.D 97 (2018) 2, 023509 Phys. Rev. Lett. 119, 171301 (2017)]

$$S_{\text{GR}}^{(2)}[h, N] = V_3 \int_0^1 N dt \left\{ \frac{q^2}{8N^2} \dot{h}^2 - \frac{\alpha_{\text{mode}}}{8} h^2 \right\} \quad \alpha_{\text{mode}} = ((n^2 - 3) + 2)$$

Equation of Motion

$$\frac{\ddot{\chi}}{N^2} + \left[\frac{\alpha_{\text{mode}}}{q^2} - \frac{1}{N^2} \frac{\ddot{q}}{q} \right] \chi = 0$$

Redefined field

$$\chi(t) = q(t)h(t)$$

General Solutions

$$\begin{aligned} \chi(t) = & \sqrt{(H^2 N^2 t(t-1) + q_f t) (H^4 N^2 t(t-1) + H^2 q_f t + \alpha_{\text{mode}})} \\ & \times \left\{ C_1 \left(\frac{H^2 N^2 (t-1) + q_f}{t} \right)^{\frac{\delta}{2}} \sqrt{\frac{H^2 N^2 (2t-1) + \sqrt{H^4 N^4 + N^2 (-4\alpha_{\text{mode}} - 2H^2 q_f) + q_f^2} + q_f}{H^2 N^2 (2t-1) - \sqrt{H^4 N^4 + N^2 (-4\alpha_{\text{mode}} - 2H^2 q_f) + q_f^2} + q_f}} \right. \\ & \left. + C_2 \left(\frac{t}{H^2 N^2 (t-1) + q_f} \right)^{\frac{\delta}{2}} \sqrt{\frac{H^2 N^2 (2t-1) - \sqrt{H^4 N^4 + N^2 (-4\alpha_{\text{mode}} - 2H^2 q_f) + q_f^2} + q_f}{H^2 N^2 (2t-1) + \sqrt{H^4 N^4 + N^2 (-4\alpha_{\text{mode}} - 2H^2 q_f) + q_f^2} + q_f}} \right\} \end{aligned}$$

Divergent perturbations

Near the singularity the solution behaves as $\delta[N] = \frac{\sqrt{(H^2 N^2 - q_f)^2 - 4N^2 \alpha_{\text{mode}}}}{(H^2 N^2 - q_f)} = -\sqrt{1 - \frac{4N^2 \alpha_{\text{mode}}}{(q_f - N^2 H^2)^2}}$

$$\chi(t) \propto C_1 F_1[N] t^{\frac{1}{2}(1-\delta)} + C_2 F_2[N] t^{\frac{1}{2}(1+\delta)} \quad (t \rightarrow 0)$$

$$S_{\text{on-shell}}^{(2)}[N] = \frac{\pi^2}{4} \left[q^2 \frac{h\dot{h}}{N} \right]_0^1 \propto C_1 t^{-\delta}, \quad C_1 C_2, \quad C_2^2 t^{\delta}$$

Zero
Divergent

$$S_{\text{on-shell}}^{(2)}[N] = -\frac{\pi^2 q_f h_f^2 \alpha_{\text{mode}} \left(- (H^2 N^2 - q_f) \delta[N] + H^2 N^2 + q_f \right)}{8N (\alpha_{\text{mode}} + H^2 q_f)}$$

Divergent perturbations

Tunneling saddle point

$$N_T = \frac{1}{H^2} \left[i \pm (q_f H^2 - 1)^{1/2} \right]$$

Saddle point action

$$\begin{aligned} \frac{i}{\hbar} S_{\text{on-shell}}^{(2)}[N_T] &= + \frac{\pi^2 q_f h_f^2 \alpha_{\text{mode}} (\sqrt{\alpha_{\text{mode}} + 1} - i \sqrt{q_f H^2 - 1})}{4\hbar (q_f H^2 + \alpha_{\text{mode}})} \\ &\approx \frac{\pi^2 n(n^2 - 1)}{4\hbar H^2} \left[1 - i n^{-1} q_f^{1/2} H + \dots \right] h_f^2 \end{aligned}$$

Inverse-Gaussian Wave function

$$\Psi(h) \sim e^{+\frac{\pi^2 \alpha_{\text{mode}}^{3/2}}{4\hbar H^2} h^2}$$


No-boundary saddle point

$$N_{\text{HH}} = \frac{1}{H^2} \left[-i \pm (q_f H^2 - 1)^{1/2} \right]$$

$$\Psi(h) \sim e^{-\frac{\pi^2 \alpha_{\text{mode}}^{3/2}}{4\hbar H^2} h^2}$$


No Smooth Spacetime

[Phys.Rev.D 110 (2024) 2, 023503, Phys. Rev. D
107 (2023) 043511, Phys.Rev.D 97 (2018) 2,
023509 Phys. Rev. Lett. 119, 171301 (2017)]



Unstable Perturbation

$$\Psi(h) \sim e^{+\frac{\pi^2 \alpha_{\text{mode}}^{3/2}}{4\hbar H^2} h^2}$$




Stable Perturbation

$$\Psi(h) \sim e^{-\frac{\pi^2 \alpha_{\text{mode}}^{3/2}}{4\hbar H^2} h^2}$$

Open or flat universe

[Phys.Rev.D 110 (2024) 2, 023503, Phys. Rev. D 100, 063517 (2019)]



Unstable Perturbation

$$\Psi(h) \sim e^{+\frac{\pi^2 \alpha_{\text{mode}}^{3/2}}{4\hbar H^2} h^2}$$

Stable Perturbation

$$\Psi(h) \sim e^{-\frac{\pi^2 \alpha_{\text{mode}}^{3/2}}{4\hbar H^2} h^2}$$

Trans-Planckian Physics

Trans-Planckian Physics

Modified dispersion relation

$$\omega^2 = \mathcal{F}(k_{\text{phys}}) \quad k_{\text{phys}} = \alpha_{\text{mode}}^{\frac{1}{2}} / q^{\frac{1}{2}}$$

Modified perturbative action

$$\begin{aligned} S^{(2)}[h, N] &= 2\pi^2 \int_0^1 N dt \left[\frac{q^2}{8N^2} \dot{h}^2 - \frac{q}{8} \mathcal{F}(k_{\text{phys}}) h^2 \right] + S_B^{(2)} \quad \chi(t) = q(t)h(t) \\ &= \frac{\pi^2}{4} \int_0^1 N dt \left[\frac{1}{N^2} \left(\dot{\chi}^2 - 2 \frac{\dot{\chi}\chi\dot{q}}{q} + \frac{\chi^2 \dot{q}^2}{q^2} \right) - \mathcal{F}(k_{\text{phys}}) \frac{\chi^2}{q} \right] + S_B^{(2)} \end{aligned}$$


Modified EOM

$$\frac{1}{N} \partial_t \left(\frac{\dot{\chi}}{N} \right) + \left[\frac{\mathcal{F}(k_{\text{phys}})}{q} - \frac{1}{qN} \partial_t \left(\frac{\dot{q}}{N} \right) \right] \chi = 0$$

Physical momentum diverges at Big-bang singularity

$$k_{\text{phys}} \rightarrow \infty \quad q \rightarrow 0$$

J. Martin and R. H. Brandenberger, Phys. Rev. D 63 (2001) 12350, Mod. Phys. Lett. A 16 (2001) 999, Phys. Rev. D 65 (2002) 103514, J. C. Niemeyer, Phys. Rev. D 63 (2001) 123502



Trans-Planckian Physics

1. Generalized Corley-Jacobson dispersion relation

$$\mathcal{F}(k_{\text{phys}}) = k_{\text{phys}}^2 + k_{\text{phys}}^2 \sum_{j=1}^p b_j \left(\frac{k_{\text{phys}}^2}{\mathcal{M}_{\text{UV}}^2} \right)^j$$

S. Corley and T. Jacobson, Phys. Rev. D 54 (1996) 1568

introduced by higher-dimensional operators of gravity !

2. Trans-Planckian cutoff

$$\mathcal{F}(k_{\text{phys}}) = \begin{cases} k_{\text{phys}}^2 & \text{for } k_{\text{phys}}^2 \ll \mathcal{M}_{\text{UV}}^2 \\ \mathcal{M}_{\text{UV}}^2 & \text{for } k_{\text{phys}}^2 \gg \mathcal{M}_{\text{UV}}^2, \end{cases}$$

3. Unruh's dispersion relation

$$\mathcal{F}(k_{\text{phys}}) = \mathcal{M}_{\text{UV}}^2 \tanh^{2/b} \left[\left(\frac{k_{\text{phys}}^2}{\mathcal{M}_{\text{UV}}^2} \right)^{\frac{b}{2}} \right]$$

W. G. Unruh, Phys. Rev. D 51 (1995) 2827

Generalized Corley-Jacobson dispersion relation

Equation of motion in UV (p=2)

$$\frac{\ddot{\chi}}{N^2} + \left\{ \frac{\alpha_{\text{mode}}}{q^2} \left[1 + b_2 \left(\frac{\alpha_{\text{mode}}}{q \mathcal{M}_{\text{UV}}^2} \right)^2 \right] - \frac{1}{N^2} \frac{\ddot{q}}{q} \right\} \chi = 0$$

Solutions in UV (p=2)

$$\begin{aligned} \chi(t) = & C_3 (N^2 H^2 (t-1) + q_f)^{\zeta_1} t^{\zeta_2} \exp \left[-\frac{\sqrt{-\alpha_{\text{mode}} \beta} N (N^2 H^2 (2t-1) + q_f)}{(N^2 H^2 - q_f)^2 (N^2 H^2 (t-1) + q_f) t} \right] \\ & + C_4 (N^2 H^2 (t-1) + q_f)^{\zeta_2} \tau^{\zeta_1} \exp \left[+\frac{\sqrt{-\alpha_{\text{mode}} \beta} N (N^2 H^2 (2t-1) + q_f)}{(N^2 H^2 - q_f)^2 (N^2 H^2 (t-1) + q_f) t} \right] \end{aligned}$$

Near the singularity $\tau = 0$ the solution behaves as

$$\chi(t) \propto C_3 F_3[t, N] e^{-\frac{\lambda}{t}} + C_4 F_4[t, N] e^{+\frac{\lambda}{t}} \quad \zeta_1 = 1 - 2 \frac{N^3 H^2 \sqrt{-\alpha_{\text{mode}} \beta}}{(N^2 H^2 - q_f)^3}, \quad \zeta_2 = 1 + 2 \frac{N^3 H^2 \sqrt{-\alpha_{\text{mode}} \beta}}{(N^2 H^2 - q_f)^3}$$

Divergent

Generalized Corley-Jacobson dispersion relation

$$\mathcal{F}(k_{\text{phys}}) = k_{\text{phys}}^2 + k_{\text{phys}}^2 \sum_{j=1}^p b_j \left(\frac{k_{\text{phys}}^2}{\mathcal{M}_{\text{UV}}^2} \right)^j$$

$$\beta = b_2 \alpha_{\text{mode}}^2 / \mathcal{M}_{\text{UV}}^4$$

$$\lambda = \sqrt{-\alpha_{\text{mode}} \beta} N / (H^2 N^2 - q_f)^2$$

Generalized Corley-Jacobson dispersion relation

[Phys.Rev.D 110 (2024) 2, 023503,
Phys. Rev. D 107 (2023) 043511]

Tunneling saddle point

$$N_T = \frac{1}{H^2} \left[i \pm (q_f H^2 - 1)^{1/2} \right]$$

Saddle point action

$$\frac{i}{\hbar} S_{\text{on-shell}}^{(2)}[N] = \begin{cases} +\frac{\pi^2}{4\hbar} \frac{\alpha_{\text{mode}}^{3/2} b_2^{1/2}}{\mathcal{M}_{\text{UV}}^2} h_f^2 & \text{for } \text{Re}[\lambda] < 0 \\ -\frac{\pi^2}{4\hbar} \frac{\alpha_{\text{mode}}^{3/2} b_2^{1/2}}{\mathcal{M}_{\text{UV}}^2} h_f^2 & \text{for } \text{Re}[\lambda] > 0. \end{cases}$$

$$\lambda[N_T] = \frac{\sqrt{-\alpha_{\text{mode}} \beta} N_T}{(N_T^2 H^2 - q_f)^2} = -\frac{\alpha_{\text{mode}}^{3/2} b_2^{1/2}}{4q_f \mathcal{M}_{\text{UV}}^2} \left(1 + i\sqrt{q_f H^2 - 1} \right)$$

Inverse-Gaussian Wave function

$$\Psi(h_f) \sim e^{+\frac{\pi^2}{4\hbar} \frac{\alpha_{\text{mode}}^{3/2} b_2^{1/2}}{\mathcal{M}_{\text{UV}}^2} h_f^2}$$

No-boundary saddle point

$$N_{\text{HH}} = \frac{1}{H^2} \left[-i \pm (q_f H^2 - 1)^{1/2} \right]$$

$$\Psi(h_f) \sim e^{-\frac{\pi^2}{4\hbar} \frac{\alpha_{\text{mode}}^{3/2} b_2^{1/2}}{\mathcal{M}_{\text{UV}}^2} h_f^2}$$

Trans-Planckian cutoff

[Phys.Rev.D 110 (2024) 2, 023503,
Phys. Rev. D 107 (2023) 043511]

Equation of motion (UV)

$$\frac{\ddot{\chi}}{N^2} + \left\{ \frac{\mathcal{M}_{\text{UV}}^2}{H^2 N^2 (t-1)t + q_f t} - \frac{2H^2}{H^2 N^2 (t-1)t + q_f t} \right\} \chi = 0$$

Trans-Planckian cutoff

$$\mathcal{F}(k_{\text{phys}}) = \begin{cases} k_{\text{phys}}^2 & \text{for } k_{\text{phys}}^2 \ll \mathcal{M}_{\text{UV}}^2 \\ \mathcal{M}_{\text{UV}}^2 & \text{for } k_{\text{phys}}^2 \gg \mathcal{M}_{\text{UV}}^2, \end{cases}$$

Solutions in UV

Meijer G-function

Divergent

$$\chi(t) = C_5 G_{2,2}^{2,0} \left(\begin{matrix} \frac{3-\Delta/H}{2}, \frac{3+\Delta/H}{2} \\ 0, 1 \end{matrix} \middle| \frac{H^2 N^2 t}{H^2 N^2 - q_1} \right) \Delta = \sqrt{9H^2 - 4\mathcal{M}_{\text{UV}}^2}$$

$$- C_6 \frac{H^2 N^2 t}{H^2 N^2 - q_1} {}_2F_1 \left(\frac{1-\Delta/H}{2}, \frac{1+\Delta/H}{2}; 2; \frac{H^2 N^2 t}{H^2 N^2 - q_1} \right)$$

hypergeometric function

On-shell action

$$S_{\text{on-shell}}^{(2)}[N] = \frac{\pi^2 N h_f^2 q_f}{8} \left\{ \frac{q_f (\mathcal{M}_{\text{UV}}^2 - 2H^2)}{(H^2 N^2 - q_f)} \frac{{}_2F_1 \left(\frac{3-\Delta}{2}, \frac{3+\Delta}{2}; 3; \frac{H^2 N^2}{H^2 N^2 - q_f} \right)}{{}_2F_1 \left(\frac{1-\Delta}{2}, \frac{1+\Delta}{2}; 2; \frac{H^2 N^2}{H^2 N^2 - q_f} \right)} - 2H^2 \right\}$$

Inverse-Gaussian
Wave function

Summary

1. ローレンツ経路積分に基づいてHartle-Hawking 無境界仮説とトンネル仮説が近年定式化された。
2. Picard-Lefschetz理論(+Resurgence理論)を応用することで厳密に解析可能。
3. しかし、Background + 摂動で波動関数を解析すると時空の量子揺らぎは指数的に増大することが示唆される。
4. 量子宇宙論の摂動論的問題は一般相対性理論を超えた枠組み(Trans-Planckian Physics)においても存在する。

