

Index Theorems on Torsional Geometries

arXiv:0704.2111[hep-th] to appear in JHEP

木村 哲士 (京大基研)

基研研究会「弦理論と場の理論 — 量子と時空の最前線」於 近畿大学 2007年8月8日


Motivation

Towards **Realistic** Physical Model from SUPERGRAVITY as effective theory of STRINGS

- 物質場とその相互作用
- 統一対称性とその破れ
- 重力、宇宙項
- etc.

運動方程式:

$$\begin{aligned} \text{dilatino } 0 &= \mathcal{D}(\omega)\lambda - \frac{1}{12}H_{MNP}\Gamma^{MNP}\lambda = \mathcal{D}(\omega - \frac{1}{3}H)\lambda \\ \text{gaugino } 0 &= \mathcal{D}(\omega, A)\chi - \frac{1}{12}H_{MNP}\Gamma^{MNP}\chi = \mathcal{D}(\omega - \frac{1}{3}H, A)\chi \end{aligned}$$



3種のスピンの接続: $\hat{\omega} \equiv \omega - \frac{1}{3}H$, $\omega_{\pm} \equiv \omega \pm H$ の関係は?
 ゼロモードの数、**指数**は変わるのか?
 4次元有効理論に登場する**世代数**は変わるのか?

SUGRA vs SUSY QM

様々な指数定理 (参照: Green-Schwarz-Witten 14章)

- **Dirac index by $\mathcal{D}(\omega)$** : $C^{\infty}(S_+) \rightarrow C^{\infty}(S_-)$

index $\mathcal{D}(\omega) \equiv (\# \text{ of left chiral}) - (\# \text{ of right chiral})$

$$\rightarrow \mathcal{N} = 1 \text{ QM: } \mathcal{D}(\omega) \sim Q^1$$

- **Euler characteristic by $d + d^{\dagger}$** : $C^{\infty}(\Lambda^{\text{even}}) \rightarrow C^{\infty}(\Lambda^{\text{odd}})$

$\chi(\mathcal{M}) \equiv (\# \text{ of harm. even-forms}) - (\# \text{ of harm. odd-forms})$

$$\rightarrow \mathcal{N} = 2 \text{ QM: } d \sim Q, d^{\dagger} \sim \bar{Q}$$

- **Hirzebruch signature by $d + d^{\dagger}$** : $C^{\infty}(\Lambda^{\text{SD}}) \rightarrow C^{\infty}(\Lambda^{\text{ASD}})$

$\sigma(\mathcal{M}) \equiv (\# \text{ of self-dual forms}) - (\# \text{ of anti-self dual forms})$

$$\rightarrow \mathcal{N} = 2 \text{ QM: } d \sim Q, d^{\dagger} \sim \bar{Q}$$

$$\text{index } \mathcal{D}(\omega) = \lim_{\beta \rightarrow 0} \text{Tr} \{ \Gamma_{(5)} e^{-\beta \mathcal{H}} \} = \lim_{\beta \rightarrow 0} \frac{(-i)^{D/2}}{2^{D/2}} \text{Tr} \prod_{A=1}^D (\varphi^A + \bar{\varphi}^A) \exp\left(-\frac{\beta}{\hbar} \mathcal{H}^1\right)$$

$$\chi(\mathcal{M}) = \lim_{\beta \rightarrow 0} \text{Tr} \{ \Gamma_{(5)} \tilde{\Gamma}_{(5)} e^{-\beta \mathcal{H}} \} = \lim_{\beta \rightarrow 0} \text{Tr} \prod_{A=1}^D (\varphi^A + \bar{\varphi}^A) \prod_{B=1}^D (\varphi^B - \bar{\varphi}^B) \exp\left(-\frac{\beta}{\hbar} \mathcal{H}\right)$$

$$\sigma(\mathcal{M}) = \lim_{\beta \rightarrow 0} \text{Tr} \{ \Gamma_{(5)} e^{-\beta \mathcal{H}} \} = \lim_{\beta \rightarrow 0} (-i)^{D/2} \text{Tr} \prod_{A=1}^D (\varphi^A + \bar{\varphi}^A) \exp\left(-\frac{\beta}{\hbar} \mathcal{H}\right)$$

$\mathcal{N} = 1$ SUSY Quantum Mechanics

$$\{\psi^A, \psi^B\} = \hbar \delta^{AB}$$

$$Q^1 = \psi^M g^{\frac{1}{4}} \pi_M g^{-\frac{1}{4}} = \psi^M g^{\frac{1}{4}} \left(p_M - \frac{i}{2} \omega_{MAB} \psi^{AB} \right) g^{-\frac{1}{4}}$$

$$\{Q^1, Q^1\} = 2\hbar \mathcal{H}^1, \quad \mathcal{H}^1 = \frac{1}{2} g^{-\frac{1}{4}} \pi_M g^{MN} \sqrt{g} \pi_N g^{-\frac{1}{4}} + \frac{\hbar^2}{8} R(\omega)$$

$\mathcal{N} = 2$ SUSY Quantum Mechanics

$$\{\varphi^A, \bar{\varphi}^B\} = \hbar \delta^{AB}, \quad \{\varphi^A, \varphi^B\} = 0$$

$$Q = \varphi^M g^{\frac{1}{4}} \pi_M g^{-\frac{1}{4}} = \varphi^M g^{\frac{1}{4}} \left(p_M - i \omega_{MAB} \varphi^A \bar{\varphi}^B \right) g^{-\frac{1}{4}}$$

$$\{Q, Q\} = 0, \quad \{Q, \bar{Q}\} = 2\hbar \mathcal{H}$$

$$\mathcal{H} = \frac{1}{2} g^{-\frac{1}{4}} \pi_M g^{MN} \sqrt{g} \pi_N g^{-\frac{1}{4}} - \frac{1}{2} R_{ABMN}(\omega) \varphi^M \bar{\varphi}^N \varphi^A \bar{\varphi}^B$$

Extend! (Ansatz: $dH = 0$)

$$\mathcal{N} = 1 \text{ QM: } \omega \rightarrow \hat{\omega} = \omega - \frac{1}{3}H, \mathcal{D}(\omega) \rightarrow \mathcal{D}(\hat{\omega}) \sim Q_H^1$$

$$\{Q_H^1, Q_H^1\} = 2\hbar \mathcal{H}_H^1$$

$$\mathcal{N} = 2 \text{ QM: } d \rightarrow d_H = d + \frac{1}{3}H \wedge \sim Q_H$$

$$\{Q_H, Q_H\} \sim (dH) = 0, \{Q_H, \bar{Q}_H\} = 2\hbar \mathcal{H}_H$$

Dirac index

$$\text{index } \mathcal{D}(\hat{\omega}, A) = \int_{\mathcal{M}} \exp \left[\frac{1}{2} \text{tr} \log \left(\frac{iR(\omega_+)/4\pi}{\sinh(iR(\omega_+)/4\pi)} \right) \right] \text{Tr}_R \exp \left(\frac{i}{2\pi} F \right)$$

Euler characteristic

$$\chi(\mathcal{M}) = \frac{1}{(4\pi)^n n!} \mathcal{E}_{A_1 \dots A_{2n}} \int_{\mathcal{M}} R^{A_1 A_2}(\omega) \wedge \dots \wedge R^{A_{2n-1} A_{2n}}(\omega)$$

Hirzebruch signature

$$\sigma(\mathcal{M}) = \int_{\mathcal{M}} \exp \left[\frac{1}{2} \text{tr} \log \left(\frac{iR(\omega_+)/2\pi}{\tanh(iR(\omega_+)/2\pi)} \right) \right]$$

Comments

- $\hat{\omega}$ in EOM, ω_- in the Hamiltonian, ω_+ in the Index
- ゼロモードの数が変わる! • 世代数は変わらない!!