$x^\mu(\xi)$

$T^{\mu\nu} = p^{\mu\alpha} \partial_\alpha x^\nu$

$\nabla_\nu T^{\mu\nu} \quad 0$

$D_4 = \frac{1}{\sqrt{-g_{44}}} \partial_4$

$\int p^{\mu 4} \, d^\alpha \xi$

$-\partial_\alpha x^{[\mu} p^{\nu]\alpha} = -\partial_\alpha S^{\mu\nu\alpha}$

$D_a = \partial_a + \gamma_a D_4$

$\partial_\alpha p^{\mu\alpha} = 0$

$\partial_\alpha F = F_{,\alpha}$

$M^{\mu\nu} = \int m^{\mu\nu 4} \, d^3 \xi$

$\begin{cases} p^{\mu\alpha} = f^{\alpha\beta} A^\mu_\beta \\ S^{\mu\nu}{}_\gamma = A^{[\mu}_\alpha A^{\nu]}_\beta \sigma^{\alpha\beta}{}_\gamma \end{cases}$

$D_\alpha F = F_{j\alpha}$.

$\partial_\alpha m^{\mu\nu\alpha} = 0$

?

RESEARCH INSTITUTE FOR FUNDAMENTAL PHYSICS
(YUKAWA HALL)
Kyoto University
Kyoto, Japan